

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u ratarstvu, povtarstvu i voćarstvu.

AKTIVNA MATERIJA: Fluazifop-p-butil (150 g/l preparata)

DELOVANJE: Spektrum sadrži aktivnu materiju fluazifop-p-butil iz grupe arilofenoksipropionata. Spada među najefikasnije graminicide za suzbijanje uskolisnih korova. Nakon tretmana vrlo brzo se usvaja i translocira do tkiva zaduženih za vegetativni porast. Inhibira enzime koji su odgovorni za sintezu lipida i vrlo brzo posle tretiranja zaustavlja porast korova. Simptomi delovanja herbicida su vidljivi nakon par dana, a do potpunog propadanja korova dolazi nakon 14 – 21 dana. Pored visoke efikasnosti u suzbijanju korova, Spektrum je veoma selektivan i bezbedan po gajene useve u kojima se primenjuje.

PRIMENA:

Gajena biljka	Količina primene	Vreme primene
Jabuka		u toku vegetacije zasada do početka cvetanja počev od prve godine uzgoja, a korovi u fazi 3-5 listova
Kruška		
Dunja		
Šećerna repa	0,8 l/ha (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova)	u fazi od nicanja do početka cvetanja, a kada su korovi u fazi intenzivnog porasta
Suncokret	1,3 l/ha (za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova)	
Soja		u toku vegetacije useva najkasnije do početka cvetanja, a korovi u fazi 3-5 listova
Krompir		
Luk		

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji uskolisni korovi:

- | | |
|----------------|------------------------------|
| Svračica | <i>Digitaria sanguinalis</i> |
| Proso korovsko | <i>Echinocloa crus-galli</i> |
| Sivi muhar | <i>Setaria glauca</i> |
| Zeleni muhar | <i>Setaria viridis</i> |

Višegodišnji uskolisni korovi:

- | | |
|--------------|--------------------------|
| Divlji sirak | <i>Sorghum halepense</i> |
|--------------|--------------------------|

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima, posebno različitih formulacija proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

NAPOMENE: U toku jedne godine na istoj površini može se primeniti jednom, eventualno dva puta u split aplikaciji 0,6 + 0,6 l/ha u intervalu 7-10 dana za suzbijanje divljeg sirka (*Sorghum halepense*) iz semena i rizoma.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Voće	28
Krompir i luk	42
Šećerna repa	70
Suncokret i soja	Obezbeđen vremenom primene

PAKOVANJE: 1 l

