

☎ ☎ ☎ ☎ ☎ Helyes út a növényvédelemben

NÖVÉNYVÉDELMI ÉS TÁPLÁLÁSI PROGRAM 2012



GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.



▶ HAGYOMÁNY ▶ MINŐSÉG ▶ BIZALOM



- ▶ Több, mint fél évszázada a mezőgazdaság szolgálatában
- ▶ Szerbia legnagyobb növényvédőszer-gyártója 25%-os piaci részesedéssel
- ▶ 100 minőségi készítményt tartalmazó áru kínálat, ebből mintegy 70 saját kifejlesztésű termék
- ▶ Összesen 149 alkalmazott, közülük 71 különböző profilú, magas szakképesítésű (vegyész, technológus, növényvédelmi mérnök...)
- ▶ Az ISO 9001:2008 minőségi tanúsítvány követelményei szerinti, szabványosított ügyvezetési rendszer
- ▶ Akkreditált laboratórium az SRPS ISO/IEC 17025:2006-os standard szerinti fizikai és vegyszeti kutatások lebonyolítására
- ▶ Számítógépes rendszer irányította automatizált termelési folyamat
- ▶ 2006. óta tartó tagság a Generikus Növényvédőszer-gyártók Európai Szervezetének
- ▶ Felelősségteljes viszonyulás
 - a mezőgazdasági termelők
 - a lakosság
 - a környezet iránt





JAVASLAT A NÖVÉNYVÉDŐSZEREK ALKALMAZÁSÁRA

A felhasználandó növényvédőszer kiválasztásakor ügyelni kell arra, hogy azt a vegyszert válasszuk, amelyik rendelkezése szerint a legmegfelelőbb az adott helyzetben és a legkevésbé ártalmas az emberekre, illetve a környezetre nézve.

Akár hivatásszerűen foglalkozik növényvédelemmel, akár csak időnként használja ezeket a vegyszereket, kiválasztásukkor vegye figyelembe a következő körülményeket:

- A kártevők irtásakor a megfelelő agrotechnikai eljárásokat és a vegyszeres megoldásokat alkalmazza együttesen.
- A rovarirtó vegyszerek hatékonysága az alkalmazás időpontjának helyes megválasztásától (a kártevő fejlődési szakasza, a termesztett növény fenofázisa stb.), az alkalmazás módjától, de mindenek előtt a vegyszerek helyes megválasztásától függ.
- A preparátum használata előtt olvassa el az utasítást, tartsa be ajánlásait és a veszélyekre való figyelmeztetés szerint járjon el. Tudnia kell azt is, mi a teendő, ha baleset történik.
- A növényvédő szerek használatakor az egészségügyi-technikai óvintézkedések általános szabályait be kell tartani, védőöltözék és –eszközök segítségével óvjuk bőrünket és nyálkahártyánkat a szerekkel való érintkezéstől.
- Használat előtt ellenőrizze a készülékeket és a felszerelést, ezeknek kifogástalan technikai állapotban kell lenniük, hogy biztonságosan és pontosan működhessenek (például a porlasztó és a szelepek).
- A permetezés módjának meghatározásakor okvetlenül vegye figyelembe az időjárás-előrejelzést. Ellenőrizze a szél irányát és sebességét, amennyiben a feltételek kedvezőtlené váltak, hagyja abba a permetezést. Kerülje a vegyszerek használatát az érzékeny haszonnövények vagy a folyók közelében, amikor fennáll a vegyszerszóródás veszélye. Ha elkerülhetetlenül permeteznie kell ilyen helyeken is, csökkentse a nyomást és a porlasztás sebességét. Vegye figyelembe, hogy száraz időben intenzívebb a párolgás, ami csökkenti a csöppek nagyságát és növeli a szétszóródás veszélyét. Permetezésre legalkalmasabb a hűvös, nedves idő és a 2 m/sec-nál nem erősebb szél.
- Vegye figyelembe a következő tényezőket is: egyazon vegyszer többszöri használata ugyanabban az évben, hasonló, vagy azonos hatású preparátumok alkalmazása, illetve a monokultúrás termesztés, a kártevők ellenállóképességének fokozását okozhatja.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a növényvédőszer használata után kötelező:

- elmosni a felhasznált készülékeket, lehetőleg még a vegyszerek használatának helyszínén,
- a felhasználatlan növényvédőszer az előírásoknak megfelelő helyen kell tárolni, vagy biztonságos módon megsemmisíteni,
- a vegyszeres palackokat, csomagolóanyagokat ne használja másra, az üresek jól mossa el (legalább háromszor), a folyadékot öntse a permetezőgép tartályába, a vegyszeres palackokat több helyen is szűrje ki és csak az ilyen hulladék tárolására előlátott helyen hagyja,
- tisztítsa meg a védőfelszerelést.

Preparátumaink használatáról érdeklődjön a Galenika Fitofarmacija szakszolgálatánál.

Megjegyzés: A Galenika Fitofarmacija Rt. növényvédőszerait tartalmazó program áttekintése reklám- és kommerciális céllal készült, a benne található adatok pontosak. Mégsem vállalhatunk felelősséget a szövegben előfordulható olyan esetleges pontatlanságokért, amelyek a preparátumok nem rendeltetésszerű felhasználását okozhatják. Ezért a legjobb szándékkal azt tanácsoljuk, hogy vegyszereink használatakor és tárolásakor, akár csak más növényvédőszer esetében, mindig tartsák be a készítményhez mellékelt használati utasítást.

A különböző típusú és formulációjú növényvédőszer- és lombtrágyák keverésének sorrendje

Mielőtt több preparátum kombinált használatáról döntene, olvassa el a használati utasítást, amely tartalmazza a készítmények keverésére vonatkozó tudnivalókat is.

Több különböző formulációjú vegyszer keveréke a következő sorrendben készíthető el:

- Kevesebb mennyiségű vízben (kisebb űrtartalmú edényben) jól elkeverjük a beáztatandó porokat – WP, vagy a vízben oldódó granulátumokat – WG, ezután folyamatos keverés mellett beöntjük a permetező tartályába, amelyet előzőleg űrtartalma egyharmadáig megtöltöttünk vízzel.
- Ezt követően, további folyamatos keverés mellett, a permetező tartályába beöntjük a koncentrált szuszpenziót – SC, amit előzőleg kis mennyiségű vízben ugyancsak előkészítettünk.
- Ez után keverjük hozzá az emulzióképző folyékony permetezőszert – EC.
- Ezt követően adhatjuk hozzá a vízben oldható növényvédőszeret – SL.
- A lombtrágyákat a végén keverjük bele.
- Végül a tartályt feltöltjük a még hiányzó vízmennyiséggel.

Az előkészített növényvédőszer-keveréket, az előírt szabályok betartásával, tanácsos minél rövidebb idő alatt elhasználni.

Amennyiben lúgos kémhatású vizet használunk, akkor a lombtrágyákat elsőként keverjük be, a többi formulációt pedig a fent leírt sorrendben adagoljuk.

PÉLDA: (az alma védelmében alkalmazható kombinációk egyike)

MANKOGAL 80 (WP)
+
GALOFUNGIN T (SC)
+
DIMETOGAL (EC)
+
FOLIGAL SUPER (lombtrágya)



Szükséges vegyszermennyiség a koncentráció és a permetező űrtartalmának függvényében

Koncentráció	A PERMETEZŐ ŰRTARTALMA (liter)							
	1	5	10	15	20	50	100	400
	SZÜKSÉGES VEGYSZERMENNYISÉG (g, ml)							
0,01 %	0,1	0,5	1	1,5	2	5	10	40
0,05 %	0,5	2,5	5	7,5	10	25	50	200
0,10 %	1,0	5,0	10	15	20	50	100	400
0,15 %	1,5	7,5	15	22	30	75	150	600
0,30 %	3,0	15	30	45	60	150	300	1200
0,50 %	5,0	25	50	75	100	250	500	2000
1,0 %	10	50	100	150	200	500	1000	4000



A búza védelme

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
A mag védelme	a maggal terjedő betegségek	Mankogal S	200 g / 100 kg	E.Sz.A.
		vagy Mankogal FS	250 ml / 100 kg	E.Sz.A.
		vagy Akord 060 FS	50 ml / 100 kg	E.Sz.A.
Bokrosodás	egy- és többéves széleslevelű gyomok	Monosan herbi	2 l/ha	E.Sz.A.
		vagy Esteron	0,8 - 1 l/ha	E.Sz.A.
		vagy Monosan herbi 500	1 - 2 l/ha	E.Sz.A.
Első száríz	egy- és többéves széleslevelű gyomok valamint a <i>Gallium aparine</i> (galaj)	Esteron	0,5 l/ha	E.Sz.A.
		+ Bonaca EC	0,4 l/ha	E.Sz.A.
Második száríz	egy- és többéves széleslevelű gyomok	Mural	20 g/ha	E.Sz.A.
	egy- és többéves széleslevelű gyomok valamint a <i>Gallium aparine</i> (galaj)	Mural + Bonaca EC	20 g/ha 0,4 l/ha	E.Sz.A. E.Sz.A.
A második száríztól a zászlós levél megjelenéséig	a levél és a szár betegségei	Antre plus	1,5 l/ha	42
	vetésfehérítő bogár lárvája	Fobos EC	0,1 l/ha	35
	egy- és többéves széleslevelű gyomok	Tezis	10 g/ha	E.Sz.A.
	egy- és többéves széleslevelű gyomok valamint a <i>Gallium aparine</i> (galaj)	Bonaca EC vagy Tezis + Bonaca EC	0,8 l/ha 10 g/ha 0,4 l/ha	E.Sz.A. E.Sz.A. E.Sz.A.
A virágzás kezdete	kalászfuzárium, a levél és a szár betegségei	Antre plus	1,5 l/ha	42
Tarló - aratás után	teljes gyomirtás	Glifol	4 - 10 l/ha	
RÁGCSÁLÓK IRTÁSA				
Teljes vegetációs időben	rágcsálók irtása	Cink - fosfid mamak	5 g/aktív rágcsálójárat	

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



A kukorica védelme

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
A mag védelme	talajlakó férgek, a sarjadás ideje alatt	Furadan 35 ST vagy Pozitron FS	150 - 200 ml/10 kg mag	E.Sz.A.
			60 - 80 ml/10 kg mag	
Vetés után, sarjadás előtt	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Acetogal Plus vagy Trophy EC + Rezon vagy Tangenta SC	2 l/ha	E.Sz.A.
			2 l/ha	E.Sz.A.
			1-1,5 l/ha	E.Sz.A.
sarjadás után a kukorica 2-5 leveles fejlődési szakasza	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Avalon vagy Plamen vagy Monosan herbi vagy Esteron vagy Monosan herbi extra	2 l/ha	E.Sz.A.
			0,5 - 0,7 l/ha	E.Sz.A.
			2 l/ha	E.Sz.A.
			0,7 - 1 l/ha	E.Sz.A.
sarjadás után a kukorica 6 leveles fejlődési szakaszaig	egy- és többéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Talisman + Avalon vagy Plamen	0,6 - 0,8 l/ha	E.Sz.A.
			1 l/ha	E.Sz.A.
			2 l/ha	E.Sz.A.
sarjadás után a kukorica 6 leveles fejlődési szakaszaig	egy- és többéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Talisman + Tangenta SC	0,7 l/ha	E.Sz.A.
			1 l/ha	E.Sz.A.
			1 l/ha	E.Sz.A.
sarjadás után a kukorica 10 leveles fejlődési szakaszaig	széleslevelű és egyes keskenylevelű gyomnövények	Talisman extra	1-1,25 l/ha	E.Sz.A.
			2 l/ha	E.Sz.A.
sarjadás után a kukorica 10 leveles fejlődési szakaszaig	széleslevelű és egyes keskenylevelű gyomnövények	Tangenta SC	1 l/ha	E.Sz.A.
			1 l/ha	E.Sz.A.
sarjadás után a kukorica 10 leveles fejlődési szakaszaig	széleslevelű és egyes keskenylevelű gyomnövények	Tangenta SC	2 l/ha	E.Sz.A.
			1-1,5 l/ha	E.Sz.A.

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



A napraforgó védelme

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
KÁRTEVŐK IRTÁSA				
A mag védelme	drótféreg	Furadan 35 ST	2 l/100 kg mag	E.Sz.A.
Inkorporáció	talajlakó férgek irtása	Posse 25 EC	4 l/ha	E.Sz.A.
Szalagvetésben		Posse 25 EC	2 l/ha	E.Sz.A.
GYOMIRTÁS				
Vetés után, sarjadás előtt	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Acetogal vagy Acetogal plus vagy Trophy EC	1,8-2 l/ha	E.Sz.A.
		+ Rezon	1,5 l/ha	E.Sz.A.
		vagy Galolin mono	2 l/ha	E.Sz.A.
Levélen keresztül történő gyomirtás	fenyércirok, muhar, ujjasmuhar, perje, réti zabfű, vadcirok magról	Gallant Super vagy Rafal 120 vagy Globus EC	0,5 - 0,75 l/ha	E.Sz.A.
			0,8 l/ha	E.Sz.A.
	rizómás vadcirok, tarackbúza, tarackfű, réti perje	Gallant Super vagy Rafal 120 vagy Globus EC	1 l/ha	E.Sz.A.
			1 - 1,2 l/ha	E.Sz.A.
		1,2 - 1,5 l/ha	E.Sz.A.	
		2 l/ha	E.Sz.A.	
BETEGSÉGEK KEZELÉSE				
butonizációs szakasz	rothadás	Kubik plus	2,5 l/ha	42

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



A szója védelme

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
GYOMIRTÁS				
Inkorporáció	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Rampa EC vagy Gamit 4 EC	0,75 l/ha	E.Sz.A.
Vetés után, sarjadás előtt	egyéves fűfélék és széleslevelű gyomnövények	Acetogal vagy Acetogal plus vagy Trophy EC	1,8 - 2 l/ha	E.Sz.A.
		+ Dancor 70 WG vagy Galolin mono	0,4 kg/ha	E.Sz.A.
			2 l/ha	E.Sz.A.
				E.Sz.A.
Levélen keresztül történő gyomirtás, a szója és a gyomok sarjadása után (szója 1-3 háromleveles fejlődési szakasza)	egyéves fűfélék és széleslevelű gyomnövények	Galbenon + Okvir + Alteox T prima	2 l/ha 8 g/ha 0,1%	63 E.Sz.A.
		Gamit 4-EC vagy Rampa EC + Galbenon + Okvir + Alteox T prima	0,5 l/ha 2 l/ha 8 g/ha 0,1%	E.Sz.A. 63 E.Sz.A.
	fenyércirok, muhar, ujjasmuhar, perje, réti zabfű, vadcirok magról	Gallant Super vagy Rafal 120 vagy Globus EC	0,5 - 0,75 l/ha 0,8 l/ha 1 l/ha	E.Sz.A. E.Sz.A. 77
rizómás vadcirok, tarackbúza, tarackfű, réti perje	Gallant Super vagy Rafal 120 vagy Globus EC	1 - 1,2 l/ ha 1,2 - 1,5 l/ha 2 l/ha	E.Sz.A. E.Sz.A. 77	

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



A cukorrépa védelme

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
KÁRTEVŐK IRTÁSA				
A mag védelme	drótféreg, májusi cserebogár pajor, pattanóbogár lárvája	Furadan 35 ST vagy Pozitron FS	4 l/100 kg mag 75-150 ml/vetési egységenként	E.Sz.A. E.Sz.A.
vetéssel egyidejű kezelés	talajlakó férgek irtása	Radar versus G	15-20 kg/ha	E.Sz.A.
kezelés egész területen vetés előtt		Posse 25 EC + Fobos EC	2 l/ha 0,5 l/ha	E.Sz.A. E.Sz.A.
		Posse 25 EC	4 l/ha	E.Sz.A.
a kártevők irtása a vegetációban	répabarkó, bagolylepke és levéltetvek	Konzul Fobos	1,5 - 2 l/ha 0,2 - 0,3 l/ha	28 21
GYOMIRTÁS				
Levélen keresztül történő gyomirtás	egy- és többéves széleslevelű gyomok; mezei aszat, parlagfű, árva napraforgó, stb.	Lontrel - 100 vagy Pikogal plus	0,6 - 1,2 l/ha 0,2 - 0,4 l/ha	E.Sz.A. E.Sz.A.
		Gallant Super vagy Globus EC vagy Rafal 120	0,5 - 0,75 l/ha	E.Sz.A.
	1 l/ha		77	
	0,8 l/ha		E.Sz.A.	
	rizómás vadcirok tarackbúza, tarackfű, réti perje	Gallant Super vagy Globus EC vagy Rafal 120	1 - 1,2 l/ha	E.Sz.A.
			2 l/ha	77
1,2 l/ha	E.Sz.A.			
BETEGSÉGEK KEZELÉSE				
megelőzőként vagy az első tünetek megjelenésekor	a levél sűrűkefoltossága	Dakoflo 720 SC	1,5 - 2 l/ha	21
a tünetek megjelenésének kezdetén	a levél sűrűkefoltossága	Antre plus	1,5 l/ha	42

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



Az olajrepce védelme

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
KÁRTEVŐK IRTÁSA				
kártévők irtása ősszel	repce-levéldarázs	Konzul	0,7 - 1 l/ha	56
	nagy repcebolha	Fobos EC	0,15 l/ha	49
kártévők irtása tavasszal	repcefénybogár	Fobos EC	0,1 - 0,2 l/h	49
	repceszárormányos és egyéb			
	bagolylepke			
GYOMIRTÁS				
Inkorporáció	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Rampa EC	0,3 l/ha	E.Sz.A.
Levélen keresztül (repce kétlevelű fázisban vagy 10 - 15 cm magasság)	egy- és többéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Lontrel 100 vagy	0,6-1 l/ha	E.Sz.A.
		Pikogal Plus +	0,2-0,3 l/ha	E.Sz.A.
		Globus	1,5 - 2 l/ha	E.Sz.A.
A MAGSZÓRÓDÁS MEGGÁTOLÁSA				
betakarítás előtt	a magszóródás meggátolása	Nu Film 17	0,7 l/ha	

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



A téli és tavaszi árpa védelme

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
bokrosodás	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Monosan herbi	1,5 l/ha	E.Sz.A.
		Galbenon	3 l/ha	E.Sz.A.
első száríz	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények valamint a <i>Gallium aparine</i>	Monosan herbi + Bonaca EC	1,5 l/ha 0,4 l/ha	E.Sz.A. E.Sz.A.
	a levél és a szár betegségei	Antre plus	1,5 l/ha	42
az első szárízról a zászlós levél megjelenéséig	a levél és a szár és a kalász betegségei, vetésfehérítő bogár lárvája	Antre plus + Fobos EC	1,5 l/ha 0,1 l/ha	42 35
	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Tezis	10 g/ha	E.Sz.A.
	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények valamint a <i>Gallium aparine</i>	Bonaca EC vagy Tezis	0,8 l/ha 10 g/ha	E.Sz.A. E.Sz.A.
		+ Bonaca EC	0,4 l/ha	E.Sz.A.
tarló az aratás után	teljes gyomirtás	Glifol	4 - 10 l/ha	
A RÁGCSÁLÓK IRTÁSA				
a teljes vegetációs időben	a rágcsálók irtása	Cink - fosfid mamak	5 g aktív járatonként	

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



A termő lucerna védelme

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
nyugalmi állapot (a vegetáció indulása előtt)	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Dancor 70 WG*	0,7 kg/ha	E.Sz.A.
		Okvir + Alteox T Prima	15-20 g/ha 0,1%	E.Sz.A.
a vegetáció indulásától a háromleveles fázisig	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Galbenon	3 l/ha	63
	keskenylevelű gyomok	Rafal 120	1,2 l/ha	E.Sz.A.
az első kaszálás után	a lucernabogár és a lucernaböde lárvája	Etiol tečni	1,5 - 2,5 l/ha	14
		Tonus	0,25 kg/ha	28
		Fenitrotion 50 EC	1,5 l/ha	42
A RÁGCSÁLÓK IRTÁSA				
a teljes vegetációs időben	a rágcsálók irtása	Cink - fosfid mamak	5 g aktív járatonként	

* a vegyszer regisztrálása folyamatban van

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



A káposzta védelme

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
ültetés előtt	keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Zanat	4 - 5 l/ha	63
	talajlakó kártevők irtása	Radar versus G vagy Galition G-5	20 - 25 kg/ha sorokba 20 - 25 kg/ha sorokba	E.Sz.A. 45
ültetés	talajbetegségek, palántadőlés betegsége	Balb	15 - 25 ml/10 l víz	
	káposztalepke, bolha, poloska, levél bagolypille	Fobos EC	0,5 l/ha	21
8 - 10 nappal a palántálás után	keskenylevelű gyomok	Rafal 120 *	0,8 - 1,2 l/ha	30
	bolhák és tetvek	Dimetogal	0,05 - 0,1%	28
	káposztalepke, bolha, poloska, levél bagolypille	Fenitrothion 50 EC	0,15 %	35
	peronoszpóra, alternáriás betegség	Dakoflo	2,5 - 3 l/ha	14
rozetta képződése	atka, tripszek	Dimetogal	0,1%	28
	levél bagolypille	Kozak	0,2 l/ha	14
	káposztalepke, bolha, poloska	Cipkord 20 EC	0,05%	28
	peronoszpóra, alternáriás betegség	Dakoflo	2,5 - 3 l/ha	14
fejképződés	peronoszpóra, alternáriás betegség	Dakoflo	2,5 - 3 l/ha	14
	tetvek, bagolypille	Tonus + Rebus	0,25 kg/ha + 0,4 l/ha	14

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

* Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha

Galop 4 - 5 l/ha

Glifol vagy Dominator 4 - 6 l/ha

A természetett növény sarjadása előtt a kihajtott gyomokra



A burgonya védelme

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
ültetés előtt	talajlakó kártevők	Galition G - 5	40-50 kg /ha az egész területen	70
ültetéskor és feltöltéskor		vagy Radar versus G	20+20 kg/ha sorokba és sorok közé, kétoldalúan	E.Sz.A.
ültetés után, sarjadás előtt	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Zanat	4-6 l/ha	63
		Dancor 70 WG	0,75 - 1 kg/ha	42
kihajtás után	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Dancor 70 WG	0,50-0,75kg/ha	42
a növény 15-20cm magassága a gyomnövény 2-6, illetve 3-5 leveles fázisa	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Galbenon	2 - 3 l/ha	E.Sz.A.
	egy- és többéves keskenylevelű gyomnövények	Rafal 120	0,8-2 l/ha	42
sorformálódás	peronoszpóra, alternáriás betegség	Mankogal 80 vagy Dakoflo	2,5 kg/ha 3 l/ha	14 21
	krumplibogár	+ Abastate + Nu Film 17	0,075% + 0,1%	E.Sz.A.
szorzódás	peronoszpóra, alternáriás betegség, krumplibogár	Fuzija + Abastate + Nu Film 17	2,5 l/ha 0,075% + 0,1%	21 E.Sz.A.
a virágzás kezdete	peronoszpóra, alternáriás betegség, krumplibogár, levéltetvek	Fuzija +	2,5 l/ha	21
		Tonus	0,25 kg/ha	14
teljes virágzás	peronoszpóra, alternáriás betegség, krumplibogár, levéltetvek	Vokal +	3 kg/ha	21
		Tonus	0,25 kg/ha	14
elvirágzás	peronoszpóra, krumplibogár, levéltetvek	Vokal +	3 kg/ha	21
		Tonus	0,25 kg/ha	14
gumóképződés	peronoszpóra	Kardinal	0,4 l/ha	7

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



A paradicsom védelme - termelés palántáról

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
ültetés előtt	egyéves fűfélék, illetve széleslevelű gyomnövények	Zanat	4-5 l/ha	42
	talajlakó kártevők	Galation G-5 vagy Radar versus G	20-25 kg/ha a sorokba 20-25 kg/ha a sorokba	45 E.Sz.A.
	talajbetegségek és a palántadőlés betegsége	Balb	15-25 ml / 10 l öntözés	
szétültetett palánta 6-8 levél	tetvek	Dimetogal	0,05 - 0,1%	28
	peronoszpóra, alternáriás betegség	Vokal	2,5 - 3 kg/ha	14
	lisztharmat és alternáriás betegség	Akord	0,075%	21
	bakteriózis	Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50*	0,25% 0,5%	14 14
1-2 héttel a szétpalántálás után	egyéves széleslevelű gyomnövények	Dancor 70 WG	0,5 -0,75 kg/ha	42
	fűfélék	Rafal 120 **	0,8 - 1,2 l/ha	30
	peronoszpóra, alternáriás betegség	Fuzija	2,5 l/ha	21
	tetvek és bolhák	Dimetogal	0,05% - 0,1%	28
	atkák, tripszek és aknázómoly	Abastate + Nu-film 17	0,075% + 0,1%	3
	üvegházi molytetű (liszteske)	Harpun	0,025% - 0,05%	3
védekezés az első szedésig, betartva az élelmezés- egészségügyi várakozási időt	lisztharmat és alternáriás betegség	Akord	0,075%	21
	bakteriózis	Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50*	0,25% + 0,5%	14
	peronoszpóra, szürke- és fehérpenész	Vokal + Dional 500 SC	2,5 -3 kg/ha 0,1 - 0,2 %	14 14
	tripszek, legyek, aknázómoly, tetvek	Fobos EC	0,02 - 0,05%	7
	tetvek	Abastate + Nu-film 17	0,075%+0,1%	3
	üvegházi molytetű (liszteske)	Elisa + Fobos EC	0,05% + 0,05%	3
szedések közötti védekezés, betartva az élelmezés- egészségügyi várakozási időt	plamenjača i crna pegavost	Fuzija	2,5 - 3 l/ha	14
	siva i bela trulež	Dional 500 SC	0,1 - 0,2%	14
	vaši	Fobos EC	0,02 - 0,05%	7
	grinje, tripsi, mineri	Abastate + Nu-film 17	0,075%+0,1%	3
	bela leptirasta vaš	Elisa + Harpun	0,05% + 0,05%	3

* A nagyobb hatékonyság érdekében a kezelést 60 perccel a permetlé bekeverése után kell elvégezni

** A kúszótarack irtásához 2 l/ha szükséges

Galop 4 - 5 l/ha
Glifol vagy Dominator 4 - 6 l/ha | A termesztett növény sarjadása előtt a kihajtott gyomokra

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

     Helyes út a növényvédelemben



A körte védelme

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
nyugalmi vegetációs időszak	körte-levelbolha	Galmin + Cipkord 20 EC	3% 0,03%	E.Sz.A. 28
rügyduzzadás	tűzelhalás, korompenész, varasodás	Bakarni oksihlorid 50 vagy Cuprozin 35 WP	0,6% 0,35%	E.Sz.A. E.Sz.A.
“egérfül”	korompenész, varasodás körte-levelbolha	Metod 480 SC + Harpun	0,3% 0,1%	21 28
fehérbimbós állapot	korompenész, varasodás körte-levelbolha, rügysodró moly	Metod 480 SC + Tonus	0,3% 0,04%	21 28
virágzás	korompenész, varasodás	Akord plus	0,3%	21
elvirágzás	korompenész, varasodás	Mankogal 80 + Abastate	0,3% 0,1%	21 14
	körte-levelbolha, gubacsatkák, növénytetvek	Galmin vagy Nu Film 17	0,5% 0,15%	21
elvirágzás utáni első kezelés	korompenész, varasodás	Akord WG + Metod 480 SC	0,03% 0,3%	21 21
		Mankogal 80 + Tonus + Harpun	0,3% 0,04% 0,1%	21 28 28
elvirágzás utáni második kezelés	korompenész, varasodás körte-levelbolha, növénytetvek, almamoly	Mankogal 80 + Tonus + Harpun	0,3% 0,04% 0,1%	21 28 28
elvirágzás utáni harmadik kezelés	korompenész, varasodás almamoly	Metod 480 SC + Konzul	0,3% 0,1%	21 28
elvirágzás utáni negyedik kezelés	tárolási betegségek, körte-levelbolha	Galofungin 500 SC + Abastate + Nu Film 17	0,1% 0,1% 0,15%	15 14
elvirágzás utáni ötödik kezelés	tárolási betegségek, almamoly	Galofungin 500 SC + Konzul	0,1% 0,1%	15 21
Jesenje plavo tretiranje	tűzelhalás, virágperzselés, ág- és törzselhalás, varasodás	Bakarni oksihlorid 50 vagy Cuprozin 35 WP	0,75% 0,35%	E.Sz.A. E.Sz.A.

gyomnövényirtás: Galop - 2-3 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)

Glifol - 4-5 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)

Starane 250 vagy Bonaca - 1 l/ha (apró szulák és vadszeder)

Ne kerüljön a gyomirtó a természetett növényre

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

35

35

E.Sz.A.





Az alma védelme

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
rügyduzzadás	tűzelhalás, korompenész, varasodás, pajzstetvek, levéltetvek és atkák petéi,	Bakarni oksihlorid 50	0,5%	E.Sz.A.
		vagy Cuprozin 35 WP	0,35%	E.Sz.A.
		+ Galmin	2 - 3%	E.Sz.A.
		vagy Plavo ulje	2 - 3%	E.Sz.A.
"egérfül"	korompenész, varasodás bimbólikasztó	Mankogal 80 + Fobos EC	0,3% 0,05%	E.Sz.A. 28
zöldbimbós állapot	korompenész, varasodás, lisztharmat	Pehar + Mankogal 80 + preparat na bazi sumpora	0,1% 0,3%	E.Sz.A. E.Sz.A.
pirosbimbós állapot	korompenész, varasodás, lisztharmat, tetvek, almailonca	Pehar	0,1%	21
		+ Mankogal 80	0,3%	21
		+ preparat na bazi sumpora + Fenitrotion 50 EC	0,1 - 0,15%	28
ezen fázisok között	piros gyümölcsfa-takácsatka, közönséges takácsatka	Abastate + Nu film 17	0,1% 0,15%	14
virágzás kezdete	korompenész, varasodás, lisztharmat	Akord WG	0,03%	21
		+ Metod 480 SC	0,3%	21
virágzás	korompenész, varasodás, lisztharmat	Pehar	0,1%	21
		+ Mankogal 80	0,3%	21
elvirágzás	korompenész, varasodás, lisztharmat, tetvek, aknázómoly	Metod 480 SC	0,3%	21
		+ Sekvcenca	0,02%	28
		+ Tonus	0,25%	28
Prvo posle precvetavanja	korompenész, varasodás, lisztharmat almamoly	Akord plus + Harpun	0,2 - 0,3% 0,1%	21 28

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



Az alma védelme

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
elvirágzás utáni második kezelés	korompenész, varasodás lisztharmat, almamoly, tetvek, aknázómoly	Metod 480 SC	0,3%	21
		+ Sekvenca	0,02%	28
		+ Konzul	0,15%	28
		+ Harpun vagy Rebus	0,1%	28
			0,1%	
elvirágzás utáni harmadik kezelés	korompenész, varasodás lisztharmat, almamoly, tetvek, aknázómoly	Dakoflo 720	0,2%	21
		+ Akord WG	0,03%	21
		+ Radar 300 EC	0,25%	28
elvirágzás utáni negyedik kezelés	korompenész, varasodás lisztharmat, tetvek	Metod 480 SC	0,3%	21
		+ Sekvenca	0,02%	28
		+ Tonus	0,025%	28
elvirágzás utáni ötödik kezelés	korompenész, varasodás lisztharmat, almamoly, aknázómoly	Dakoflo 720	0,2%	21
		+ Akord WG	0,03%	21
		+ Konzul	0,15%	28
elvirágzás utáni hatodik kezelés	tárolási betegségek	Galofungin 500 SC	0,06-0,1%	15
	korompenész, varasodás almamoly, aknázómoly, tetvek	+ Metod 480 SC	0,3%	21
		+ Rebus	0,1%	14
		+ Warant	0,014%	14
elvirágzás utáni hetedik kezelés	tárolási betegségek	Galofungin 500 SC	0,06-0,1%	15
	almamoly, aknázómoly	+ Rebus	0,1%	14

Gyomirtás:

Casoron G - 4kg/10 ár, sorok közötti gyomirtás, a vegetáció kezdete előtt

Galop - 2-3 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)

Glifol - 4 - 5 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)

Starane 250 vagy Bonaca - 1-l/ha (apró szulák és vadszeder)

E.Sz.A.

35

35

E.Sz.A.

Ne kerüljön a gyomirtó a termesztett növényre

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



A meggy védelme

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
a vegetáció kezdete	monília, antraknózis	Bakarni oksihlorid 50 vagy Cuprozin 35 WP	0,6%	E.Sz.A.
	pajzs- és levéltetvek, atkák	+ Galmin	0,35% 2%	E.Sz.A.
fehérbimbós állapot	monília	Kubik vagy Kubik plus	0,25%	42
virágzás	monília	Kubik vagy Kubik plus	0,25%	42
elhúzódó virágzás	monília	Akord	0,075%	21
elvirágzás	levélfoltosodás,	Mankogal 80	0,25%	21
	tetvek	+ Dimetogal	0,1%	21
növekvő termések	meggyeszalény	vagy Radar 300 EC	0,25%	21
	levélfoltosodás,	Mankogal 80	0,25%	21
a termés színváltozása	meggyeszalény	+ Dimetogal	0,1%	21
	termésrothadás	vagy Radar 300 EC	0,25%	21
7-14 nappal a szedés előtt	cseresznyelégység	Dional 500 SC	0,15%	14
szedés után	termésrepedés ellen	+ Tonus	0,025%	21
	levélfoltosodás	Nu Film 17	0,5%	
gubacsatkák	levélfoltosodás	Mankogal 80	0,25%	21
	gubacsatkák	+ Elisa	0,06%	21
Jesenje plavo prskanje (preko 75% opalog lišća)	monilija, antraknoza, pegavost	Bakarni oksihlorid 50	0,5 - 0,75%	E.Sz.A.
	lista višnje	ili Cuprozin 35 WP	0,35%	E.Sz.A.

gyomirtás:

Casoron G - 4 kg/10 ár, sorok közötti gyomirtás a vegetáció kezdete előtt

Galop - 3 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)

Glifol - 4-5 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)

Bonaca - 1 l/ha (apró szulák és vadszeder)

Ne kerüljön a gyomirtó a természetett növényre

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



Az őszibarack védelme

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
nyugalmi vegetációs időszak	őszibarack tafrinás levélfodrosodása, levéllyukacsosodás	Bakarni oksihlorid 50 vagy Cuprozin 35 WP	0,5 - 0,7% 0,35%	E.Sz.A. E.Sz.A.
rügyduzzadás	őszibarack tafrinás levélfodrosodása	Dakoflo 720 SC vagy Diziram 76 WG	0,25% 0,3%	E.Sz.A. 21
rügyfakadástól kisleveles korig	őszibarack-pajzsteű	Galmin	2,5 %	E.Sz.A.
virágzás	monília	Kubik vagy Kubik plus	0,25%	42
elvirágzás	levéllyukacsosodás lisztharmat	Mankogal 80 + preparat na bazi sumpora + Tonus	0,25% 0,025%	21 28
	tetvek, tripszek			
mogyorónagyságú termés	lisztharmat levéllyukacsosodás őszibarackmoly, tetvek	Akord plus + Tonus + Harpun	0,2% 0,025% 0,1%	21 28 28
		Akord WG + Metod 480 SC + Radar 300 EC vagy Konzul	0,075% 0,3% 0,25% 0,1%	7 21 28 28
15 -20 nappal a ritkítás után	rothadás és tárolási betegségek	Dional 500 SC + Cipkord 20 EC	0,15% 0,03%	7 28
	őszibarackmoly			
őszi kék kezelés	őszibarack tafrinás levélfodrosodása, levéllyukacsosodás bakteriózis	Bakarni oksihlorid 50 vagy Cuprozin 35 WP	0,5 - 0,75% 0,35%	E.Sz.A. E.Sz.A.

gyomirtás:

Casoron G - 4 kg/10 ár, sorok közötti gyomirtás a vegetáció kezdete előtt	E.Sz.A.
Gramoxone vagy Galop 2-3 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)	35
Glifol - 4 - 5 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)	35
Starane 250 vagy Bonaca - 1 l/ha (apró szulák és vadszeder)	E.Sz.A.

Ne kerüljön a gyomirtó a termesztett növényre

E.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás





A szilva védelme

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
rügyduzzadás	monília, bábaszilva, levéllyukacsosodás	Bakarni oksihlorid 50 vagy Cuprozin 35 WP	0,6%	E.Sz.A.
	pajzs- és levéltetvek, atkák	+ Galmin vagy Plavo ulje	0,35% 2% 3%	E.Sz.A. E.Sz.A. E.Sz.A.
fehérbimbós állapot	virágmonília	Kubik vagy Kubik plus	0,25%	E.Sz.A.
virágzás*	virágmonília	Kubik vagy Kubik plus	0,25%	E.Sz.A.
elvirágzás	peronoszpóra, levéllyukacsosodás szilvadarázs	Mankogal 80	0,25%	21
		+ Dimetogal	0,1%	21
növekvő termések	szilvarozsda, levéllyukacsosodás szilvamoly	Metod 480 SC	0,3%	21
	növénytetvek	+ Harpun	0,1%	28
		+ Radar 300 EC	0,25%	28
a termés színváltozása	termésmonília	Dional 500 SC	0,15%	14
	szilvamoly	+ Cipkord 20 EC	0,03%	28
őszii kék kezelés	bakteriózis, levéllyukacsosodás, monília, peronoszpóra	Bakarni oksihlorid 50 vagy Cuprozin 35 WP	0,5 - 0,75%	E.Sz.A.
			0,35%	E.Sz.A.

* hosszabb nedves időjárás esetén ez a kezelés is ajánlott a monília elkerülése céljából

gyomirtás:

Casoron G - 30 kg/ha, sorok közötti gyomirtás a vegetáció kezdete előtt

Galop - 3 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)

Glifol - 4 - 5 l/ha, k15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)

Rafal 120 - 1-2 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskenylevelű)

Ne kerüljön a gyomirtó a termesztett növényre

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



A málna védelme

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
rügyduzzadás és rügyfakadás (kötözés után)	a hajtások elszáradása, pajzstetvek, levéltetvek téli petéi	Bakarni oksihlorid 50	0,6%	E.Sz.A.
		vagy Cuprozin 35 WP	0,35%	E.Sz.A.
		+ Galmin	2%	E.Sz.A.
		vagy Plavo ulje	2 - 3%	E.Sz.A.
levélképződés kezdete (10-15cm hosszú oldalhajtások)	a hajtások elszáradása káros rovarok	Cuprozin 35 WP	0,35%	E.Sz.A.
		+ Cipkord 20EC	0,05%	E.Sz.A.
csúcsvirág bomlása előtt	a hajtások elszáradása szürkepenész atkák, málna-vesszőszúnyog, bimbólikasztó, növénytetvek	Akord WG	0,075%	21
		+ Pehar	0,2%	14
		+ Abastate + Nu Film 17	0,075 - 0,1% + 0,1%	14
		+ Dimetogal	0,1%	21
közvetlen a virágzás kezdete előtt	a hajtások elszáradása szürkepenész málnabogár, málna- vesszőszúnyog, bimbólikasztó	Promesa	0,075%	21
		+ Pehar	0,2%	14
		+ Kozak	0,02%	28
		vagy Fobos EC	0,05%	28
14 nappal a szedés előtt	a hajtások elszáradása szürkepenész	Promesa	0,075%	21
		+ Dional 500 SC	0,2%	14
közvetlen a szedés és a hajtások eltávolítása után	a hajtások elszáradása atkák málna-gubacsszúnyog	Akord WG	0,075 %	
		+ Abastate + Nu Film 17	0,075 - 0,1% + 0,1%	
		+ Fobos EC	0,05%	
őszii kék kezelés levélhullás előtt	a hajtások elszáradása	Bakarni oksihlorid 50	0,5 - 0,75%	E.Sz.A.
		vagy Cuprozin 35 WP	0,35 %	E.Sz.A.

gyomirtás:

Casoron G - 4 kg/10 ár, sorok közötti gyomirtás a vegetáció kezdete előtt

Galop - 2 - 3 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)

Glifol - 4 - 5 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)

Starane 250 vagy Bonaca - 1 l/ha (apró szulák és vadszeder)

Ne kerüljön a gyomirtó a termesztett növényre

E.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



A szőlő védelme

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
5-10 cm hosszú hajtások	crna pegavost peplnica – primarni izvor zaraze	Mankogal 80 + preparat na bazi sumpora	0,25%	42
	eriofidne grinje	akaricid		
20-30 cm hosszú hajtások	alternáriás betegség	Metod 480 SC +	0,25%	21** i 42*
	lisztharmat – primáris fertőzésforrás (szükség szerint)	Akord WG +	0,04%	21
	gubacsatkák (szükség szerint)	Elisa	0,06%	21
virágzás előtt	peronoszpóra	Vokal +	0,3%	21** i 42*
	lisztharmat	Sekvenca EC +	0,02%	21
	gubacsatkák, káros rovarok	Elisa	0,06%	21
elvirágzás	peronoszpóra	Mankogal 80 +	0,25%	42
	lisztharmat	Legat +	0,2%	42
		Akord WG +	0,04%	21
	szürkepenész	Dional 500 SC +	0,1%	28
	kabóca	Elisa	0,06 %	21
virágzás utáni második kezelés (15 nappal az előző után, június vége)	peronoszpóra	Vokal +	0,3%	21** i 42*
	lisztharmat	Akord WG +	0,04%	21
	szürkepenész	Pehar +	0,2%	35
	szőlómoly	Cipkord 20 EC	0,03%	56
virágzás utáni harmadik kezelés, július közepe	peronoszpóra	Bordovska čorba 100 SC +	2,5 %	21** i 28*
	lisztharmat	preparat na bazi sumpora +		
	szürkepenész	Dional 500 SC +	0,1%	28
	szőlómoly	Fobos EC	0,04%	28
bogyóérés kezdete	peronoszpóra	Bakarni oksihlorid 50 +	0,5%	28
	lisztharmat	preparat na bazi sumpora +		
	szürkepenész	Pehar +	0,2%	35
	szőlómoly	Fobos EC	0,04%	28

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

* borszőlőre

** az asztali fajtákra

gyomirtás:

Casoron G - 4 kg/10 ár, sorok közötti gyomirtás a vegetáció kezdete előtt

Galop - 3-4 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)

Glifol - 4-5 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)

Gallant super - 1 l/ha (keskenylevelű)

Bonaca vagy Starane 250 - 1 l/ha (apró szulák és vadszeder)

35

35

E.Sz.A.

E.Sz.A.

E.Sz.A.



REGIONÁLIS MENEDZSEREK

1. ÉSZAK-NYUGAT BÁCSKAI ÉS ÉSZAK BÁNÁTI KÖRZET

Székhely: Bácsstopolya
Duško Vitković, okl. mérnök
mob: 063/ 457 308
e-mail: vitkovic@fitofarmacija.rs

2. DÉL BÁCSKAI KÖRZET

Székhely: Újvidék
Dušan Belenzada, okl. mérnök
mob: 063/ 10 61 299
e-mail: belenzada@fitofarmacija.rs

3. KÖZÉP BÁNÁTI KÖRZET

Székhely: Botoš-Zrenjanin
Zoran Marčić, okl. mérnök
mob: 063/ 458 150
e-mail: marcic@fitofarmacija.rs

4. DÉL BÁNÁTI KÖRZET

Székhely: Pancsova
Lidija Mitić, okl. mérnök
mob: 063/ 457 956
e-mail: mitic@fitofarmacija.rs

5. SZERÉMSÉGI KÖRZET

Székhely: Sremska Mitrovica
Marko Jojić, okl. mérnök
mob: 063/ 250 823
e-mail: jojic@fitofarmacija.rs

Az értékesítési és alkalmazási szektor munkatársai:

Predrag Milovanović, önálló szakmunkatárs, 063/457 819, milovanovic@fitofarmacija.rs

Radimir Đekić okl. mérnök, önálló szakmunkatárs, 063/457 984 djekic@fitofarmacija.rs

Mez.gaz. gyógyszertárak, Bácskai körzet, Milan Trbojević okl. mérnök, 063/457 351 trbojevic@fitofarmacija.rs

Értékesítés és alkalmazás: Zimony, Batajnički drum bb, tel: 011/3072 372; 011/3072 329, fax: 011/3072 370

Értékesítési és alkalmazási szektor, Milan Jančić igazgató, tel: 011/3072 322, janicic@fitofarmacija.rs

Vajdasági körzeti értékesítés, Brankica Trifunović-Tišma oszt.vezető, tel/fax 021/469 419; 063/850 0020, tisma@fitofarmacija.rs

Közép Szerbia, körzeti értékesítés, Milojica Pešić oszt.vezető, tel. 063/457 752 mpesic@fitofarmacija.rs

Marketing:

Agrotechnológiai osztály vezetője: Srđan Arsić okl. mérnök, 063/457 710, arsic@fitofarmacija.rs

Herbicid termék-menedzser: Piljo Dakić, tel: 011 3072 327, mob: 063/8496 249 dakic@fitofarmacija.rs

Termék-menedzser Luka Matić okl. mérnök, tel: 011/3072 366, mob: 063/106 18 86, matic@fitofarmacija.rs

Növénytáplálási program:

Kommerciális szakmunkatárs, Vajdaság : dr. Radivoje Aćimović, mob: 063/ 457 819, acimovic@fitofarmacija.rs

Kommerciális szakmunkatárs, Szerbia: Goran Petrović okl. mérnök, mob: 063/ 457 739, gpetrovic@fitofarmacija.rs