

REGIONALNI MENADŽERI

Teren 1
dipl.ing. Duško Vitković
mob. 063 457 308;
vitkovic@fitofarmacija.rs

Teren 2
dipl. ing. Slavica Nerac
mob. 063 106 12 99
nerac@fitofarmacija.rs


Teren 3
dipl.ing. Milan Trbojević
mob. 063 457 351
trbojevic@fitofarmacija.rs

Teren 3A
dipl.ing. Dimitrije Dokić
mob. 063 457 710
dokic@fitofarmacija.rs

Teren 4
dipl.ing. Dragan Hrnjak
mob. 063 458 150
hrnjak@fitofarmacija.rs

Teren 5
dipl.ing. Lidija Mitić
mob. 063 457 956
mitic@fitofarmacija.rs

Teren 6
dipl.ing. Marko Jojić
mob. 063 250 823
jojic@fitofarmacija.rs



Teren 7
dipl.ing. Zoran Kocić
mob. 063 1015 718
prodaja@fitofarmacija.rs

Teren 8
dr Radivoje Aćimović
mob. 063 457 714
acimovic@fitofarmacija.rs

Teren 9
dipl.ing. Veljko Joksimović
mob. 063 457 884
joksimovic@fitofarmacija.rs

Teren 10
dipl.ing. Jasmina Jeremić
mob. 063 10404 77
jjeremic@fitofarmacija.rs

Teren 11
dipl.ing. Tamara Popović
mob. 063 457 353
tpopovic@fitofarmacija.rs

Teren 12
dipl.ing. Sreten Rilak
mob. 063 457 891
rilak@fitofarmacija.rs

Teren 13
dipl.ing. Goran Petrović
mob. 063 457 739
gpetrovic@fitofarmacija.rs

Teren 14
dipl.ing. Dragana Dimkovska
mob. 063 10404 76
dimkovska@fitofarmacija.rs

Zastupnik i distributer za Bosnu i Hercegovinu:



GOLIĆ TRADE d. o. o.
Gradiška, ul. Romanovci bb,
tel.: 051/890-200; 051/876-581

Prodaja i primena: 11080 Zemun, Batajnički drum bb tel: 011/ 3072 372; 3072 329; fax. 3072 370
21000 Novi Sad, Narodnog Fronta 73; tel: 021/ 469 419; fax: 021/6365 276

Direktor sektora prodaje i primene: Brankica Trifunović – Tišma dipl. ing. tel: 011/ 3072 301; 063/ 850 0020; tisma@fitofarmacija.rs

Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju: Milojica Pešić dipl. ing. tel. 063/ 457 752; mpesic@fitofarmacija.rs

Koordinator prodaje za region Vojvodine: Ana Pavlović dipl.ing. tel: 063 457 364; pavlovic@fitofarmacija.rs

Osobine

Ozima veoma rana sorta

Veoma ranostasna sorta za ostvarivanje visokih i stabilnih prinosa u najrazličitijim uslovima

- Stablo niske građe
- Visoka tolerancija na poleganje
- Klas bez osja, dobro razvijen
- Intenzivno bokorenje
- Sorta velike adaptibilnosti za različite proizvodne regione
- Veoma kratka vegetacija daje mogućnost izbegavanja toplotnih udara
- Dobra tolerancija na najznačajnije bolesti



Nikol

Ekskluzivni distributer:



GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d.

Karakteristike

Ozima srednje rana sorta

Veoma fleksibilna sorta prilagodljiva većini proizvodnih uslova

- Visok potencijal prinosa
- Intenzivno bokorenje
- Čvrsto i elastično stablo srednje visine
- Visoka tolerancija na plamenjaču i rđu, kao i fuzarioze i druge bolesti klasa
- Preporučuje se preventivni tretman na pegavost lišća (*Septoria spp.*)
- Dobro razvijen klas
- Formira veoma krupno zrno



Seme rađa profit
www.lgseeds.rs

Prinosi u žetvi 2016.

Proizvođač	Mesto	Sorta	Prinos
Miće Berber	Savino Selo	Avenue	10,5 t/ha
Svetozar Stojančul	Žitište	Nikol	9,9 t/ha
PSS Agrozavod	Vršac	Avenue	10,1 t/ha
PSS Vrbas	Zmajevu	Nikol	9,7 t/ha
Voja Korica	Lačarak	Avenue	9,8 t/ha
Nenad Denić	Bojnik	Nikol	9 t/ha
Nikodijević Velibor	Donja Livadica	Avenue	9,5 t/ha
Saša Jovanović	Podina – Žitorađa	Nikol	8,2 t/ha
Vladimir Lazarov	Omoljica	Avenue	9,5 t/ha
Saša Jovanović	Podina – Žitorađa	Nikol	8,2 t/ha
Ivan Trajković	Krajince	Avenue	8,4 t/ha

Agrotehnika

Osnovna obrada zemljišta

U zavisnosti od preduseva, osobina zemljišta i vremenskih uslova, preporučujemo da se osnovna obrada izvrši na dubinu do 30 cm, ali nikako pliće od 20 cm. Nakon toga uraditi predsetvenu pripremu.

Setva

Preporuka je da se setva obavi u optimalnom roku, od 05. do 25. oktobra, u zavisnosti od proizvodnog regiona i vremenskih uslova.

Setvena norma je 450 kljavih zrna/m² što bi u uslovima dobre pripreme zemljišta i setve u optimalnom roku, iznosilo oko 200 kg/ha. Ukoliko uslovi za setvu nisu u skladu sa preporukom (loše pripremljena parcela, kašnjenje sa setvom), količinu semena povećati za 10%.

Obratiti pažnju na optimalnu dubinu setve!

Ishrana pšenice

Za osnovno đubrenje koristiti kompleksna mineralna đubriva, a količina primene zavisi od analize zemljišta i planiranog prinosa. Osnovno đubrenje uraditi neposredno pre osnovne obrade zemljišta. Time se pšenici osiguravaju osnovna biljna hraniva na dubini gde se razvija najveća masa korena. Za ishranu pšenice treba uneti od 120-160 kg/ha azota, 60-100 kg/ha fosfora i 80-100 kg/ha kalijuma. Ovim količinama se osigurava dobar prinos pšenice, a zemljište se ne osiromašuje. Celokupnu količinu fosfora, kalijuma i obavezno jednu trećinu planirane količine azota, uneti pred osnovnu obradu. Ostatak azota upotrebiti za prihranjivanje.

Preporuka za prihranu pšenice azotnim đubrivom je da se izvrši u dve faze, i to prva prihrana rano u proleće, a druga u toku intenzivnog porasta useva. Količina azota za prihranjivanje se utvrđuje na osnovu N-min metode. Ukoliko su količine azota koje treba uneti u proleće veće od 100 kg/ha, tada se ta količina obavezno deli u dva dela (70% prvi put, 30% drugi put).

Za prvu prihranu može se primeniti UREA, a za drugu prihranu KAN ili AN.

Ukoliko u toku vegetacije dođe do nedostatka hraniva, primeniti folijarnu prihranu. Prihrana može da se izvede samostalno i jednokratno ili više puta u toku vegetacije. Takođe, folijarna prihrana se može primeniti u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu pšenice od korova, bolesti i štetočina. Uobičajeno je da se koriste vodotopiva đubriva u količini 3-4 kg/ha. Za povećanje prinosa i kvaliteta zrna pšenice preporučujemo folijarno đubrivo Chopin evolution u dozi 4-5 lit/ha, koji izuzetno utiče na poboljšanje ove dve osobine pšenice.

Zaštita od korova

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, uključujući i *Gallium aparine* (prilepača) preporučujemo kombinaciju preparata Tezis 10 g/ha+Bonaca 0,5 l/ha. Navedena kombinacija se može primeniti od faze bokorenja pa sve do faze lista zastavičara.

Zaštita od bolesti

Za prvi tretman pšenice protiv prozrokovača pepelnice, rđe i lisne pegavosti preporuka je da se primeni fungicid Akord 0,5-1 l/ha. Drugi tretman obaviti na početku cvetanja, fungicidom Antre Plus u dozi 1,5 lit/ha protiv prouzrokovača fuzarioze i drugih bolesti klasa.

Zaštita od insekata

Za suzbijanje žitne pijavice (*Lema melanopa*) primeniti insekticid Fobos 0,1 l/ha. Dozvoljeno je mešanje svih navedenih herbicida, fungicida i insekticida.



Seme rađa profit
www.lgseeds.rs