

# Növényvédelmi program és termékkatalógus



Herbicidek



Fungicidek



Insekticidek



Rodenticidek



Segédanyagok



Tápanyag  
utánpótlás



2017



**GALENIKA - FITOFARMACIJA**



## ▶ HAGYOMÁNY ▶ MINŐSÉG ▶ BIZALOM



- ▶ Több, mint fél évszázada a mezőgazdaság szolgálatában
- ▶ Szerbia legnagyobb növényvédőszer-gyártója 25%-os piaci részesedéssel
- ▶ 100 minőségi készítményt tartalmazó áru kínálat, ebből mintegy 70 saját kifejlesztésű termék
- ▶ Összesen 155 alkalmazott, közülük 71 különböző profilú, magas szakképesítésű (vegyész, technológus, növényvédelmi mérnök...)
- ▶ Az ISO 9001:2008 minőségi tanúsítvány követelményei szerinti, szabványosított ügyvezetési rendszer
- ▶ Akkreditált laboratórium az SRPS ISO/IEC 17025:2006-os standard szerinti fizikai és vegyszeti kutatások lebonyolítására
- ▶ Számítógépes rendszer irányította automatizált termelési folyamat
- ▶ 2006. óta tartó tagság a Generikus Növényvédőszer-gyártók Európai Szervezetének
- ▶ Felelősségteljes viszonyulás
  - a mezőgazdasági termelők
  - a lakosság
  - a környezet iránt





# GALENIKA - FITOFARMACIJA

## JAVASLAT A NÖVÉNYVÉDŐSZEREK ALKALMAZÁSÁRA

A felhasználandó növényvédőszer kiválasztásakor ügyelni kell arra, hogy azt a vegyszert válasszuk, amelyik rendelkezése szerint a legmegfelelőbb az adott helyzetben és a legkevésbé ártalmas az emberekre, illetve a környezetre nézve.

Akár hivatásszerűen foglalkozik növényvédelemmel, akár csak időnként használja ezeket a vegyszereket, kiválasztásukkor vegye figyelembe a következő körülményeket:

- A kártevők irtásakor a megfelelő agrotechnikai eljárásokat és a vegyszeres megoldásokat alkalmazza együttesen.
- A rovarirtó vegyszerek hatékonysága az alkalmazás időpontjának helyes megválasztásától (a kártevő fejlődési szakasza, a termesztett növény fenofázisa stb.), az alkalmazás módjától, de mindenek előtt a vegyszerek helyes megválasztásától függ.
- A preparátum használata előtt olvassa el az utasítást, tartsa be ajánlásait és a veszélyekre való figyelmeztetés szerint járjon el. Tudnia kell azt is, mi a teendő, ha baleset történik.
- A növényvédő szerek használatakor az egészségügyi-technikai óvintézkedések általános szabályait be kell tartani, védőöltözék és –eszközök segítségével óvjuk bőrünket és nyálkahártyánkat a szerekkel való érintkezéstől.
- Használat előtt ellenőrizze a készülékeket és a felszerelést, ezeknek kifogástalan technikai állapotban kell lenniük, hogy biztonságosan és pontosan működhessenek (például a porlasztó és a szelepek).
- A permetezés módjának meghatározásakor okvetlenül vegye figyelembe az időjárás-előrejelzést. Ellenőrizze a szél irányát és sebességét, amennyiben a feltételek kedvezőtlené váltak, hagyja abba a permetezést. Kerülje a vegyszerek használatát az érzékeny haszonnövények vagy a folyók közelében, amikor fennáll a vegyszerszóródás veszélye. Ha elkerülhetetlenül permeteznie kell ilyen helyeken is, csökkentse a nyomást és a porlasztás sebességét. Vegye figyelembe, hogy száraz időben intenzívebb a párolgás, ami csökkenti a csöppek nagyságát és növeli a szétszóródás veszélyét. Permetezésre legalkalmasabb a hűvös, nedves idő és a 2 m/sec-nál nem erősebb szél.
- Vegye figyelembe a következő tényezőket is: egyazon vegyszer többszöri használata ugyanabban az évben, hasonló, vagy azonos hatású preparátumok alkalmazása, illetve a monokultúrás termesztés, a kártevők ellenállóképességének fokozását okozhatja.

*Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a növényvédőszer használata után kötelező:*

- elmosni a felhasznált készülékeket, lehetőleg még a vegyszerek használatának helyszínén,
- a felhasználatlan növényvédőszer az előírásoknak megfelelő helyen kell tárolni, vagy biztonságos módon megsemmisíteni,
- a vegyszeres palackokat, csomagolóanyagokat ne használja másra, az üresek jól mossa el (legalább háromszor), a folyadékot öntse a permetezőgép tartályába, a vegyszeres palackokat több helyen is szűrje ki és csak az ilyen hulladék tárolására előlátott helyen hagyja,
- tisztítsa meg a védőfelszerelést.

Preparátumaink használatáról érdeklődjön a Galenika Fitofarmacija szakszolgálatánál.

**Megjegyzés:** A Galenika Fitofarmacija Rt. növényvédőszerait tartalmazó program áttekintése reklám- és kommersziális céllal készült, a benne található adatok pontosak. Mégsem vállalhatunk felelősséget a szövegben előforduló olyan esetleges pontatlanságokért, amelyek a preparátumok nem rendeltetésszerű felhasználását okozhatják. Ezért a legjobb szándékkal azt tanácsoljuk, hogy vegyszereink használatakor és tárolásakor, akárcsak más növényvédőszeres esetében, mindig tartsák be a készítményhez mellékelt használati utasítást.

## A különböző típusú és formulációjú növényvédőszer- és lombtrágyák keverésének sorrendje

Mielőtt több preparátum kombinált használatáról döntene, olvassa el a használati utasítást, amely tartalmazza a készítmények keverésére vonatkozó tudnivalókat is.

Több különböző formulációjú vegyszer keveréke a következő sorrendben készíthető el:

- Kevesebb mennyiségű vízben (kisebb űrtartalmú edényben) jól elkeverjük a beáztatandó porokat – WP, vagy a vízben oldódó granulátumokat – WG, ezután folyamatos keverés mellett beöntjük a permetező tartályába, amelyet előzőleg űrtartalma egyharmadáig megtöltöttünk vízzel.
- Ezt követően, további folyamatos keverés mellett, a permetező tartályába beöntjük a koncentrált szuszpenziót – SC, amit előzőleg kis mennyiségű vízben ugyancsak előkészítettünk.
- Ez után keverjük hozzá az emulzióképző folyékony permetezőszert – EC.
- Ezt követően adhatjuk hozzá a vízben oldható növényvédőszeret – SL.
- A lombtrágyákat a végén keverjük bele.
- Végül a tartályt feltöltjük a még hiányzó vízmennyiséggel.

Az előkészített növényvédőszer-keveréket, az előírt szabályok betartásával, tanácsos minél rövidebb idő alatt elhasználni.

Amennyiben lúgus kémhatású vizet használunk, akkor a lombtrágyákat elsőként keverjük be, a többi formulációt pedig a fent leírt sorrendben adagoljuk.

**PÉLDA:** (az alma védelmében alkalmazható kombinációk egyike)

MANKOGAL 80 ( WP )

+

PEHAR (SC)

+

HARPUN (EC)

+

FOLIGAL SUPER (lombtrágya)





### Szükséges vegyszermennyiség a koncentráció és a permetező űrtartalmának függvényében

Koncentráció	A PERMETEZŐ ŰRTARTALMA (liter)							
	1	5	10	15	20	50	100	400
SZÜKSÉGES VEGYSZERMENNYISÉG (g, ml)								
0,01 %	0,1	0,5	1	1,5	2	5	10	40
0,05 %	0,5	2,5	5	7,5	10	25	50	200
0,10 %	1,0	5,0	10	15	20	50	100	400
0,15 %	1,5	7,5	15	22	30	75	150	600
0,30 %	3,0	15	30	45	60	150	300	1200
0,50 %	5,0	25	50	75	100	250	500	2000
1,0 %	10	50	100	150	200	500	1000	4000



## A BÚZA VÉDELME

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Bokrosodás	egy- és többéves széleslevelű gyomok	Monosan herbi 500 vagy Moto ekstra 850	1,5 - 2 l/ha	E.Sz.A.
Első száríz			0,8 - 1 l/ha	E.Sz.A.
Második száríz		Moto ekstra 850	0,8 - 1 l/ha	E.Sz.A.
A második száríztól a zászlós levél megjelenéséig	a levél és a szár betegségei	Akord	0,5 l/ha	E.Sz.A.
	vetésfehérítő bogár levéltetvek	Fobos EC vagy Polux	0,1 - 0,15 l/ha	35
			0,2 - 0,3 l/ha	35
	egy- és többéves széleslevelű gyomok	Tezis + Alteox T Prima	10 g/ha 0,1%	E.Sz.A.
Tezis + Bonaca EC		10 g/ha 0,4 l/ha	E.Sz.A. E.Sz.A.	
A virágzás kezdete	kalászfuzárium, a levél és a szár betegségei	Antre plus vagy Ceres	1,5 l/ha	42
			0,4 - 0,6 l/ha	42
Tarló - aratás után	teljes gyomirtás	Glifol	3 - 10 l/ha	

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

 Epin ekstra
  Cirkon



## A KUKORICA VÉDELME

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Vetéskor a sorokban	talajlakó kártevők ellen	Fury Geo	12,5 kg/ha	E.Sz.A.
		Radar versus G*	15 - 20 kg/ha	E.Sz.A.
Vetés előtt inkorporációval	talajlakó kártevők ellen	Fobos EC	1 l/ha	E.Sz.A.
Vetés után, kelés előtt	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Basar	1,4 - 1,5 l/ha	E.Sz.A.
		+ Rezon	2 l/ha	E.Sz.A.
kelés után a kukorica 2-5 leveles fejlődési szakaszában	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Avalon	2 l/ha	E.Sz.A.
		vagy Plamen	0,5 - 0,7 l/ha	E.Sz.A.
		vagy Monosan herbi 500	2 l/ha	E.Sz.A.
		vagy Moto ekstra 850	0,8 - 1 l/ha	E.Sz.A.
egy- és többéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	egy- és többéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Talisman	1 - 1,25 l/ha	E.Sz.A.
		+ Avalon	2 l/ha	E.Sz.A.
		vagy Plamen	0,5 - 0,7 l/ha	E.Sz.A.
Kelés után a kukorica 6 leveles fejlődési szakaszáig	egy- és többéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Talisman	1 - 1,25 l/ha	E.Sz.A.
		Talisman + Skaut	1 l/ha 0,25 l/ha	E.Sz.A. E.Sz.A.
Kelés után a kukorica 8 leveles fejlődési szakaszáig	széleslevelű és egyes keskenylevelű gyomnövények	Skaut + Alteox wet 40	0,25 l/ha 0,5%	E.Sz.A.

\* Regisztráció folyamatban

E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



## A NAPRAFORGÓ VÉDELME

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
<b>KÁRTEVŐK IRTÁSA</b>				
Vetéskor a sorokban	talajlakó kártevők ellen	<b>Radar versus G *</b>	15 - 20 kg/ha	E.Sz.A.
Vetés előtt inkorporációval	talajlakó kártevők ellen	<b>Fobos EC *</b>	1 l/ha	E.Sz.A.
<b>GYOMIRTÁS</b>				
Vetés után, kelés előtt	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	<b>Basar</b>	1 - 1,2 l/ha	E.Sz.A.
		<b>+ Rezon</b>	1,5 l/ha	E.Sz.A.
		<b>vagy Galolin mono</b>	2 l/ha	E.Sz.A.
		<b>Disk</b>	2 - 4 l/ha	E.Sz.A.
Levélen keresztül történő gyomirtás	fenyércirok, muhar, ujjasmuhar, perje, réti zabfű, vadcirok magról	<b>Gallant Super</b>	0,75 l/ha	E.Sz.A.
		<b>vagy Rafal 120</b>	1 l/ha	E.Sz.A.
		<b>vagy Globus EC</b>	1 l/ha	E.Sz.A.
	rizómás vadcirok, tarackbúza, tarackfű, réti perje	<b>Gallant Super</b>	1 - 1,2 l/ha	E.Sz.A.
		<b>vagy Rafal 120</b>	1,5 - 2 l/ha	E.Sz.A.
		<b>vagy Globus EC</b>	2 l/ha	E.Sz.A.
<b>BETEGSÉGEK KEZELÉSE</b>				
butonizációs szakasz	rothadás	<b>Kubik plus</b>	2,5 l/ha	42

\* Regisztráció folyamatban

E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő



## A SZÓJA VÉDELME

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
<b>GYOMIRTÁS</b>				
Inkorporáció	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Rampa EC	0,3 - 0,5 l/ha	E.Sz.A.
Vetés után, kelés előtt	egyéves fűfélék és széleslevelű gyomnövények	Basar	1,4 l/ha	E.Sz.A.
		+ Velton WG	0,4 kg/ha	E.Sz.A.
		+ Galolin mono	1,5 - 2 l/ha	E.Sz.A.
Levélen keresztül történő gyomirtás, a szója és a gyomok kelése után (szója 1-3 háromleveles fejlődési szakasza)	egyéves fűfélék és széleslevelű gyomnövények	Rampa EC	0,3 - 0,5 l/ha	E.Sz.A.
		+ Galbenon	2 l/ha	63
		+ Okvir	8 g/ha	E.Sz.A.
		+ Alteox T Prima	0,1 - 0,2 l/ha	E.Sz.A.
Az első háromleveles levél megjelenésétől virágzásig	muhar, ujjasmuhar, perje, réti zabfű, vadcirok magról	Gallant Super vagy Rafal 120 vagy Globus EC	0,75 l/ha	E.Sz.A.
			1 l/ha	E.Sz.A.
			1 l/ha	77
Az első háromleveles levél megjelenésétől virágzásig	rizómás vadcirok, tarackbúza, tarackfű, réti perje	Gallant Super vagy Rafal 120 vagy Globus EC	1- 1,2 l/ha	E.Sz.A.
			1,5 - 2 l/ha	E.Sz.A.
			2 l/ha	77



E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő





## A CUKORRÉPA VÉDELME

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)	
<b>KÁRTEVŐK IRTÁSA</b>					
vetéssel egyidejű sorkezelés	talajlakó kártevők irtása	<b>Radar versus G</b>	15 - 20 kg/ha	E.Sz.A.	
Az egész terület kezelése vetés előtt		<b>Fobos EC</b>	1 l/ha	E.Sz.A.	
Kártevők irtása vegetációban	répabarkó, káposzta-bagolylepke	<b>Konzul</b> vagy <b>Fobos EC</b>	1,5 - 2 l/ha	28	
			0,2 - 0,3 l/ha	21	
<b>GYOMIRTÁS</b>					
Levélen keresztül történő gyomirtás	egy- és többéves széleslevelű gyomok; mezei aszat, parlagfű, árva napraforgó, stb.	<b>Lontrel - 100</b> vagy <b>Pikogal plus</b> +	0,6 - 1,2 l/ha	E.Sz.A.	
		<b>Metak 700 SC</b> 	0,2 - 0,4 l/ha	E.Sz.A.	
			1,5 - 3 l/ha	E.Sz.A.	
		muhar, ujjasmuhar perje, réti zabfű, vadcirok magról,	<b>Gallant Super</b> vagy <b>Globus EC</b> vagy <b>Rafal 120</b>	0,75 l/ha	E.Sz.A.
				1 l/ha	77
				1 l/ha	E.Sz.A.
	rizómás vadcirok tarackbúza, tarackfű, réti perje	<b>Gallant Super</b> vagy <b>Globus EC</b> vagy <b>Rafal 120</b>	1 - 1,2 l/ha	E.Sz.A.	
			2 l/ha	77	
			1,5 - 2 l/ha	E.Sz.A.	
<b>BETEGSÉGEK KEZELÉSE</b>					
a tünetek megjelenésének kezdetén	a levél sűrűkefoltossága	<b>Dakoflo 720 SC</b> +	1,5 - 2 l/ha	21	
		<b>Sekvenca</b> 	0,4 - 0,6 l/ha	14	
	a levél sűrűkefoltossága	<b>Mankogal 80*</b> vagy <b>Dakoflo 720 SC</b> +	2 kg/ha	28	
		<b>Antre plus</b>	1,5 l / ha	21	
			1,5 l / ha	42	
		<b>Mankogal 80*</b> vagy <b>Dakoflo 720 SC</b> +	2 kg/ha	28	
<b>Ceres</b>	1,5- 2 l/ha	21			
		0,4-0,6 l/ha	42		



\* Regisztráció folyamatban

E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő



## AZ OLAJREPCE VÉDELME

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
<b>KÁRTEVŐK IRTÁSA</b>				
kártévők irtása ősszel	repce-levéldarázs	Konzul vagy Polux* 	0,7 - 1 l/ha 0,3 l/ha	56 45
	nagy repcebolha	Fobos EC	0,15 l/ha	49
kártévők irtása tavasszal	repcefénybogár	Polux* vagy Fobos EC	0,3 l/ha	45
	repceszárormányosok és egyéb		0,1 - 0,2 l/ha	49
	bagolylepkék			
<b>GYOMIRTÁS</b>				
Inkorporáció	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Rampa EC	0,3 l/ha	E.Sz.A
Levélen keresztül (repce kétleveles fázisban vagy 10 - 15 cm magasság)	egy- és többéves széles-, illetve	Lontrel 100 ili Pikogal plus 	0,6 - 1 l/ha 0,2 - 0,3 l/ha	E.Sz.A E.Sz.A
	keskenylevelű gyomnövények	Globus EC	1,5 - 2 l/ha	E.Sz.A
<b>A MAGSZÓRÓDÁS MEGGÁTOLÁSA</b>				
betakarítás előtt	a magszóródás meggátolása	Nu Film 17	0,7 l/ha	

\* Regisztráció folyamatban

E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő



## A TERMŐ LUCERNA VÉDELME

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
nyugalmi állapot (a vegetáció indulása előtt)	egyéves széleslevelű gyomnövények	Velton WG*	0,7 kg/ha	E.Sz.A.
	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Okvir* + Alteox T Prima	15 - 20 g/ha 0,1%	E.Sz.A.
a lucerna egytől háromleveles állapotáig	egy- és többéves széleslevelű gyomok	Galbenon 	2 - 3 l/ha	63
	egyéves széles- és keskenylevelű gyomok	Kvazar **	1 l/ha	35
	keskenylevelű gyomok	Rafal 120	1,5 l/ha	E.Sz.A.
az első kaszálás után	a lucernabogár és a lucernaböde lárvája	Etiol tečni **	1,5 - 2,5 l/ha	14
		Tonus 	0,25 kg/ha	28

E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

\* A lucerna egy évesnél idősebb kell hogy legyen

\*\* Regisztráció folyamatban



## A TÉLI ÉS TAVASZI ÁRPA VÉDELME ÁRPA VÉDELME

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
bokrosodás	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Monosan herbi ili	1,5 - 2 l/ha	E.Sz.A.
		Galbenon	3 l/ha	E.Sz.A.
első száríz	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények valamint a <i>Gallium aparine</i>	Monosan herbi + Bonaca EC	1,5 l/ha 0,4 l/ha	E.Sz.A. E.Sz.A.
	a levél és a szár betegségei	Antre plus	1,5 l/ha	42
a második száríztól a zászlós levél megjelenéséig	a levél és a szár és a kalász betegségei, vetésfehérítő bogár lárvája, levéltetvek, tripszek	Antre plus +	1,5 l/ha	42
		Fobos EC vagy	0,1 l/ha	35
		Polux*	0,2-0,3 l/ha	35
	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Tezis + Alteox T Prima	10 g/ha 0,1%	E.Sz.A.
	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények valamint a <i>Gallium aparine</i>	Tezis + Bonaca EC	10 g/ha 0,4 l/ha	E.Sz.A. E.Sz.A.
tarló az aratás után	teljes gyomirtás	Glifol	3 - 10 l/ha	



\* Regisztráció folyamatban

E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő



## A KÁPOSZTA VÉDELME

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
ültetés előtt	keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Zanat	4 - 5 l/ha	63
	talajlakó kártevők	klórpirifosz hatóanyagú preparát	20-25 kg/ha a sorokba	E.Sz.A.
ültetés	peronoszpóra káposztalepke, bolha, poloska, levél bagolylepke	Mankogal 80 + Cipkord 20 EC	2 kg/ha 0,15 - 0,3 l/ha	21 28
	keskenylevelű gyomok	Rafal 120 	0,8 - 2 l/ha	30
8 - 10 nappal a palántálás után	bolhák és tetvek	Etiol tečni	0,15 - 0,2%	21
	káposztalepke, bolha, poloska, levél bagolylepke	Kozak	0,2 l/ha	14
	peronoszpóra, alternáriás betegség	Mankogal 80	2 kg/ha	21
	bagolylepkék bolha, poloska peronoszpóra, alternáriás betegség	Fobos EC + piriproxifen h.a. készítmény + Dakoflo 	0,3 l/ha 0,5 l/ha 2,5 - 3 l/ha	21 21
fejképződés	peronoszpóra, alternária bakteriumos betegségek	Dakoflo + rézoksikorid h.a. készítmény + Kozak	2,5 - 3 l/ha 0,5 - 0,75%	21
	tetvek, bagolylepke		0,2 l/ha	14



É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

Ajánlott Nu Film 17 tapadószer hozzáadása fungicidekhez és inszekticidekhez, 0,3 l/ha dózisban,



## A BURGONYA VÉDELME

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
ültetés előtt ültetéskor és feltöltéskor	talajlakó kártevők	Fury Geo vagy Galition ekstra vagy Radar versus G	12,5 kg/ha	E.Sz.A.
			20+20 kg/ha u sorokba és sorok közé, két alkalommal	E.Sz.A.
ültetés után, kelés előtt	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Zanat + Galolin mono	4 l/ha	63
		Velton WG	1,5 - 2 l/ha	70
kelés után	egyéves széleslevelű gyomnövények	Velton WG 	0,75 - 1,5kg/ha	42
a növény 15-20cm magassága a gyomnövény 2-6, illetve 3-5 leveles fázisa	egy- és többéves keskenylevelű gyomnövények	Rafal 120	1 - 2 l/ha	E.Sz.A.
	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Galbenon	2 - 3 l/ha	42
sorformálódás	peronoszpóra, alternáriás betegség	Mankogal 80 +	2,5 kg/ha	14
	krumplibogár	Abastate + Nu Film 17	0,075% + 0,1%	E.Sz.A.
sorzáródás	peronoszpóra, alternáriás betegség, krumplibogár	Fuzija +	2,5 l/ha	14*
		Abastate + Nu Film 17	0,075% + 0,1%	E.Sz.A.
a virágzás kezdete	peronoszpóra, alternáriás betegség, krumplibogár, levéltetvek	Fuzija +	2,5 l/ha	14*
		Tonus vagy Polux*	0,25 kg/ha	14
teljes virágzás	peronoszpóra, alternáriás betegség, krumplibogár, levéltetvek	Alijansa vagy Fantic M +	2,5 kg/ha	21
		Tonus vagy Polux*	0,25 kg/ha	14
elvirágzás	peronoszpóra, krumplibogár, levéltetvek	Alijansa +	2,5 kg/ha	21
		Tonus vagy Polux* 	0,25 kg/ha	14
gumóképződés	peronoszpóra	Fantic M	0,5 l/ha	7
teljes beérés	peronoszpóra száradás	Kardinal +	2,5 kg/ha	14
		Kabuki 2,5 EC **	0,4 l/ha	7
			0,8 l/ha	E.Sz.A.

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő



E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

\* Regisztráció folyamatban

\*\* magtermesztésnél ajánlott a gumóképződés fázisban, amikor a hozamban a magburgonyának szánt gumók dominálnak



## A PARADICSOM VÉDELME - TERMELÉS PALÁNTÁRÓL

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
ültetés előtt	egyéves fűfélék, illetve széleslevelű gyomnövények	Zanat	4 - 5 l/ha	42
	talajlakó kártevők	Galition ekstra vagy Radar versus G vagy Fury Geo	20-25 kg/ha a sorokba 10 kg/ha a sorokba 12,5 kg/ha a sorokba	E.Sz.A. E.Sz.A. E.Sz.A.
	talajbetegségek és a palántadőlés betegsége	propamokarb h.a. preparát	15-25 ml / 10 l öntözés	
szétültetett palánta 6-8 levél	tetvek peronoszpóra, alternáriás betegség lisztharmat és alternáriás betegség	Dimetogal + Dakoflo + Akord 	0,075 - 0,1% 3 l/ha 0,75 l/ha	28 21 21
	bakteriózis	Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50*	0,25% 0,5 - 0,75%	14 14
1-2 héttel a palántálás után	egyéves széleslevelű gyomnövények	Velton WG	0,5 - 0,75 kg/ha	42
	fűfélék	Rafal 120	0,8 - 2 l/ha	30
	peronoszpóra, alternáriás betegség tetvek és bolhák	Fuzija + Dimetogal vagy Uranus*	2,5 l/ha 0,075% - 0,1%	21 28
	atkák, tripszek		0,05%	3
	üvegházi molytetű (liszteske)	Harpun + Polux*	0,05-0,075% 0,05%	3 7
7-10 nap után	lisztharmat és alternáriás betegség peronoszpóra	Akord + Alijansa	0,75 l/ha 2,5 kg/ha	21 21
	szürke- és fehérpenész	Dional 500 SC	0,1-0,2%	21
	peronoszpóra	Nukleus* + Fobos EC + Elisa vagy Abastate + Nu-Film 17	2,5 - 3 l/ha 0,05% 0,05% 0,075% + 0,1%	21 7 3 3
szedések közötti védekezés, betartva az élelmezés-egészségügyi várakozási időt	peronoszpóra, alternária, szürke-és fehérpenész tetvek	Promesa + Fobos EC	0,75 l/ha 0,05%	3 7
	atka, tripszek, aknázómoly			
Rovarok ellen szedés alatt	üvegházi molytetű ,tetvek	Harpun 	0,075%	3
		Abastate + Nu-Film 17	0,075%+0,1%	3

\* Regisztráció folyamatban

E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő



## A MEGGY VÉDELME

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
vegetáció kezdete	monília, antraknózis pajzs- és levéltetvek, atkák	Bakarni oksihlorid 50 + Galmin*	0,75% 2%	E.SZ.A E.SZ.A
fehérbimbós állapot	monília	Kubik plus vagy Neon	0,25% 0,05%	E.SZ.A 14
teljes virágzás	monília	Kubik plus vagy Neon	0,25% 0,05%	E.SZ.A 14
elhúzódó virágzás	monília	Neon vagy Akord	0,05% 0,075%	14 21
elvirágzás	levélfoltosodás, monília levéltetvek meggyeszalény	Mankogal 80 vagy Galileo*	0,25% 0,075%	21 35
		+ Sekvenca + Dimetogal	0,02% 0,1%	E.SZ.A 21
növekvő termések	levélfoltosodás, monília levéltetvek ,meggyeszalény	Mankogal 80 vagy Galileo*	0,25% 0,075%	21 35
		+ Sekvenca + Radar 300 EW	0,02% 0,25%	E.SZ.A 28
a termés színváltozása	termésrothadás, levélfoltosodás cseresznyelég	Mankogal 80 + Dional 500 SC	0,25% 0,15%	21 14
		+ Tonus* + Polux*	0,05% 0,07%	28 14
14 nappal a szedés előtt	termésrothadás, cseresznyelég	Dional 500 SC + Polux*	0,15% 0,07%	14 14
szedés után	levélfoltosodás atkák	Mankogal 80 + Neon + Abastate*	0,25% 0,05% 0,1%	E.SZ.A E.SZ.A E.SZ.A
		+ Nu Film 17	0,03%	E.SZ.A
őszi, kék kezelés	monília, antraknózis levélfoltosodás	Bakarni oksihlorid 50	0,5 - 0,75%	E.SZ.A

\* Regisztráció folyamatban

gyomirtás: Glifol - a gyomok 10-40 cm-esek ( 4 évnél idősebb ültetvényben )

2 - 4 l/ha egyéves

4 - 8 l/ha többéves gyomok esetében

Bonaca EC - 1,5 - 2 l/ha (széleslevelű gyomok, apró szulák és vadszeder)

Ne kerüljön a gyomirtó a természetett növényre

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



35

35

E.Sz.A



## AZ ALMA VÉDELME

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
rügyduzzadás	tűzelhalás, varasodás, pajzstetvek, levéltetvek és atkák petéi, bimbólikasztó	Bakarni oksihlorid 50 vagy Cuprozin 35 WP + Galmin vagy Plavo ulje + Cipkord 20 EC	0,5% 0,35% 2 - 3% 2 - 3% 0,02%	E.Sz.A. E.Sz.A. E.Sz.A. E.Sz.A. 28
"egérfül"	lisztharmat, varasodás  bimbólikasztó	Pehar + Mankogal 80 + Cosavet 80-DF + Fobos EC	0,1% 0,25% 0,3% 0,05%	28 21 21 28
zöldbimbós állapot	varasodás, lisztharmat levéltetvek, bimbólikasztó	Pehar + Mankogal 80 + Foton + Cosavet 80-DF + Konzul	0,1% 0,25% 0,02% 0,3% 0,1%	28 21 21 21 28
pirosbimbós állapot	varasodás, lisztharmat, levéltetvek	Neon + Mankogal 80 + Cosavet 80-DF + Radar 300 EW 	0,05-0,07% 0,25% 0,3% 0,25%	28 21 21 28
pirosbimbós állapot - fehérbimbós állapot között	piros gyümölcsfa-takácsatka, közönséges takácsatka	Uranus + Abastate + Nu Film 17 ili Galmin	0,05% 0,07% 0,1% 0,3%	14 14  21
virágzás kezdete	varasodás, lisztharmat	Neon + Galileo + Foton	0,05-0,07% 0,075-0,1% 0,02%	28 35 21
virágzás	varasodás, lisztharmat	Neon + Galileo + Lunar	0,05-0,07% 0,075-0,1% 0,02%	28 35 21
elvirágzás	varasodás, lisztharmat, levéltetvek, aknázómolyok	Sekvenca + Galileo + Polux*	0,02% 0,075-0,1% 0,03%	28 35 7
első kezelés virágzás után	varasodás, lisztharmat aknázómoly, levéltetvek, almamoly	Kardinal + Sekvenca + Harpun + Tonus + Nu Film 17 	0,06% 0,02% 0,1% 0,05% 0,1%	21 28 28 28 28





## AZ ALMA VÉDELME

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
elvirágzás utáni második kezelés	varasodás lisztharmat, almamoly, levéltetvek	Kardinal	0,06%	21
		+ Sekvenca	0,02%	28
		+ Triton*	0,25-0,3%	7
		+ Radar EW	0,25%	28
		+ Nu Film 17	0,03%	
elvirágzás utáni harmadik kezelés	varasodás lisztharmat, almamoly, levéltetvek	Kardinal	0,06%	21
		+ Sekvenca	0,02%	28
		+ Foton	0,02%	21
		+ Konzul	0,1%	28
elvirágzás utáni negyedik kezelés	varasodás lisztharmat, almamoly	Metod 480 SC	0,3%	21
		+ Akord	0,03%	21
		+ Lunar	0,02%	21
		+ Fobos EC	0,05%	28
elvirágzás utáni ötödik kezelés	varasodás lisztharmat, almamoly,	Metod 480 SC	0,3%	28
		+ Akord	0,03%	21
		+ Foton	0,02%	21
		+ Konzul	0,1%	28
		+ Nu Film 17	0,03%	
szükség esetén	atkák	Uranus	0,05%	14
		+ Abastate	0,1%	14
		+ Galmin vagy	0,3%	21
		+ Nu Film 17	0,1%	
elvirágzás utáni hatodik kezelés	varasodás, lisztharmat almamoly, levéltetvek	Metod 480 SC	0,3%	21
		+ Lunar	0,02%	21
		+ Harpun	0,1%	28
		+ Tonus	0,05%	28
		+ Nu Film 17	0,03 %	
elvirágzás utáni hetedik kezelés	tárolási betegségek almamoly, alternária	Galofungin T	0,1%	14
		+ Dional 500 SC	0,15%	14
		+ Triton*	0,25-0,3%	7
		+ Polux*	0,03%	7
15 nappal szedés előtt	tárolási betegségek almamoly, alternária	Galofungin T	0,1%	14
		+ Dional 500 SC	0,15%	14
		+ Polux*	0,03%	7



\* Regisztráció folyamatban

Gyomirtás: Gallant Super - 1 - 1,5 l/ha E.Sz.A  
 Glifol - 2 - 4 l/ha egyéves gyomok 35  
 4 - 8 l/ha többéves gyomok 35  
 Bonaca EC - 1,5 - 2 l/ha (apró szulák és vadszeder) E.Sz.A  
 Ne kerüljön a gyomirtó a természetett növényre

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő  
 E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



## A KÖRTE VÉDELME

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
nyugalmi vegetációs időszak	körte-levélbolha	Galmin + Cipkord 20 EC	3% 0,03%	E.Sz.A. 28
rügyduzzadás	tűzelhalás, varasodás	Bakarni oksihlorid 50	0,5-0,7%	E.Sz.A.
“egérfül”	varasodás körte-levélbolha	Metod 480 SC + Konzul + Nu Film 17	0,3% 0,15% 0,1%	21 28
fehérbimbós állapot	varasodás körte-levélbolha, gubacsatkák	Mankogal 80 + Fobos EC + Galmin	0,25% 0,05% 0,5%	21 28 21
virágzás	varasodás	Pehar* + Mankogal 80 	0,1% 0,25%	28 21
elvirágzás	korompenész, varasodás körte-levélbolha, gubacsatkák	Pehar* + Metod 480 SC + Kulisa * + Fobos EC 	0,1% 0,3% 0,035% 0,05%	28 21 14 28
elvirágzás utáni első kezelés	varasodás körte-levélbolha, gubacsatkák	Mankogal 80 + Sekvenca* + Tonus + Abastate + Nu Film 17	0,25% 0,02% 0,05% 0,15% 0,1%	21 28 28 14
elvirágzás utáni második kezelés	varasodás körte-levélbolha, gubacsatkák almamoly	Metod 480 SC + Sekvenca* + Tonus + Konzul + Nu Film 17	0,3% 0,02% 0,05% 0,1% 0,1%	21 28 28 28



## A KÖRTE VÉDELME

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
elvirágzás utáni harmadik kezelés	varasodás  körte-levélbolha	Mankogal 80	0,25%	21
		+ Harpun	0,15%	28
		+ Abastate	0,15%	14
		+ Galmin	0,3%	21
elvirágzás utáni negyedik kezelés	varasodás, tárolási betegségek, körte-levélbolha, almamoly	Metod 480 SC	0,3%	21
		+ Galofungin T*	0,1%	14
		+ Fobos EC	0,05%	28
		+ Nu Film 17	0,1%	
elvirágzás utáni ötödik kezelés	tárolási betegségek, körte-levélbolha	Galofungin T*	0,1%	14
		+ Abastate	0,15%	14
		+ Kulisa *	0,035%	14
		+ Nu Film 17	0,1%	
15 nappal a szedés előtt	tárolási betegségek, körte- levélbolha, almamoly	Galofungin T* + Polux *	0,1% 0,05%	14 7
őszi, rezes kezelés	tűzelhalás, varasodás, körte-levélbolha	Bakarni oksihlorid 50	0,5 – 0,75%	E.Sz.A.
		+ Konzul	0,15%	E.Sz.A.

\* Regisztráció folyamatban

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő  
E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

Gyomirtás: **Glifol** - a gyomok 10-40 cm-esek ( 4 évnél idősebb ültetvényben)

2 - 4 l/ha egyéves

35

4 - 8 l/ha többéves gyomok esetében

35




**Bonaca EC** - 1,5 - 2 l/ha (széleslevelű gyomok)

E.Sz.A.

Ne kerüljön a gyomirtó a természetett növényre



## A SZILVA VÉDELME

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
vegetáció kezdte előtt- rügyduzzadás	Kórokozók és kártevők áttelelő formái	Bakarni oxihlorid 50 + Galmin vagy Plavo ulje	0,5-0,75%  3%  3%	E.Sz.A.  E.Sz.A.  E.Sz.A.
virágzás kezdete (a virágok 20%-a nyitva)	monília	Kubik plus	0,25%	E.Sz.A.
teljes virágzás	monília	Kubik plus 	0,25%	E.Sz.A.
elvirágzás	peronoszpóra, monília levéllyukacsosodás	Akord + Mankogal 80 + Dimetogal 	0,075%  0,25%  0,075 - 0,1%	21  21  21
	szilvarozsda, levéllyukacsosodás monília,	Metod 480 SC + Akord + Radar 300 EC + Polux*	0,2 - 0,3%  0,075%  0,15 - 0,25%  0,03-0,05%	21  21  28  14
	Szilvamoly, levéltetvek			
növekvő termések	szilvarozsda, levéllyukacsosodás monília,  Szilvamoly, levéltetvek	Metod 480 SC + Akord + Radar 300 EC + Polux*	0,2 - 0,3%  0,075%  0,15 - 0,25%  0,03-0,05%	21  21  28  14
a termés színváltozása	termésmonília, levéllyukacsosodás  szilvamoly, levéltetvek	Metod 480 SC + Dional 500 SC* + Fobos EC 	0,3%  0,15%  0,05%	21  14  28
14 nappal a szedés előtt	monília,  kártevők	Dional 500 SC* + Polux*	0,15%  0,03 - 0,05%	14  14
őszii kék kezelés	levéllyukacsosodás, monília, peronoszpóra	Bakarni oxihlorid 50	0,5 - 0,75%	E.Sz.A.

\* Regisztráció folyamatban

Gyomirtás: **Glifol** - a gyomok 10-40 cm-esek ( 4 évnél idősebb ültetvényben)

2 - 4 l/ha egyéves

4 - 8 l/ha többéves gyomok esetében

**Bonaca EC** - 1,5 - 2 l/ha (széleslevelű gyomok)

Ne kerüljön a gyomirtó a természetett növényre

35

35

E.Sz.A.

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



## AZ ŐSZIBARACK VÉDELME

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
nyugalmi vegetációs időszak	a patogének áttelelő formái ellen	Bakarni oksihlorid 50	0,5 – 0,75%	E.Sz.A.
rügyduzzadás	tafrinás levélfodrosodás	Dakoflo 720 SC vagy Diziram 76 WG vagy Galileo*	0,25 – 0,35% 0,3% 0,075-0,1%	E.Sz.A. 21 E.Sz.A.
rügyfakadás kezdete ("zöldpont")	tafrinás levélfodrosodás	Dakoflo 720 SC vagy Diziram 76 WG vagy Galileo*	0,25 – 0,35% 0,3% 0,075-0,1%	E.Sz.A. 21 E.Sz.A.
virágzás	monília	Dional 500 SC	0,15%	7
elvirágzás	levéllyukacsosodás lisztharmat, monília tetvek, tripszek	Metod 480 SC + Akord + Tonus + Polux*	0,2-0,3 % 0,075 % 0,04% 0,03-0,05%	21 7 28 14
diónagyságú termés	lisztharmat, monília levéllyukacsosodás barackmoly, tetvek, tripszek	Metod 480 SC + Akord + Harpun + Tonus	0,25% 0,075% 0,1% 0,05%	21 7 28 28
ritkítás után	lisztharmat, monília levéllyukacsosodás barackmoly	Mankogal 80* + Akord + Dimetogal	0,25% 0,075% 0,15-0,2%	21 7 21
15 -20 nappal a ritkítás után	levéllyukacsosodás, monília kártevők	Diziram 76 WG + Dional 500 SC + Fobos EC	0,3% 0,15% 0,05%	21 7 28
7 nappal a szedés előtt	termésmonília, barackmoly	Dional 500 SC  Polux*	0,15% 0,05%	7 14
őszi rezes kezelés	levéllyukacsosodás tafrinás levélfodrosodása	Bakarni oksihlorid 50	0,75%	E.Sz.A.

\* Regisztráció folyamatban

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő  
E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

Gyomirtás: **Glifol** - a gyomok 10-40 cm-esek ( 4 évnél idősebb ültetvényben)

2 - 4 l/ha egyéves

35

4 - 8 l/ha többéves gyomok esetében

35



**Bonaca EC** - 1,5 - 2 l/ha (széleslevelű gyomok)

E.Sz.A.

Ne kerüljön a gyomirtó a természetett növényre



## A MÁLNA VÉDELME

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
rügyduzzadás és rügyfakadás (kötözés után)	a hajtások száradása,	Cuprozin 35 WP +	0,35%	E.Sz.A.
		Galmin*	2%	E.Sz.A.
	pajzstetvek, levéltetvek gubacsatkák áttelelő formái	vagy Plavo ulje	2 - 3%	E.Sz.A.
levélképződés kezdete	a hajtások száradása kártevő rovarok	Cuprozin 35 WP +	0,35%	E.Sz.A.
		Fobos EC*	0,03%	E.Sz.A.
csúcsvirág bomlása előtt (10 - 15 cm hosszú oldalhajtások)	a hajtások száradása	Akord*	0,075%	21
	szürkepenész	+ Pehar	0,2%	14
	atkák, málna-vesszőszúnyog,	+ Abastate + Nu Film 17	0,1%+0,1%	14
	bimbólikasztó, levéltetvek	+ Kozak 	0,03%	28
közvetlen a virágzás kezdete előtt	peronoszpóra	Alijansa**	65 g / 10 l vode	E.Sz.A.
	a hajtások száradása szürkepenész	Promesa +	0,075%	10
	málnabogár, málna- vesszőszúnyog, bimbólikasztó	Pehar +	0,2%	14
		Kozak	0,03%	28
14 nappal a szedés előtt	a hajtások száradása szürkepenész	Promesa +	0,075%	10
		Dional 500 SC	0,2%	14
7 nappal a szedés előtt	szürkepenész	Atlas* 	0,8 kg/ha	7
közvetlen a szedés és a hajtások eltávolítása után	a hajtások száradása atkák	Akord*	0,075 %	E.Sz.A.
		+ Abastate + Nu Film 17	0,1%+0,1%	E.Sz.A.
	málna-gubacsszúnyog	+ Fobos EC*	0,03%	E.Sz.A.
őszi rezes kezelés levélhullás előtt	a hajtások száradása	Cuprozin 35 WP	0,35 %	E.Sz.A.

\* Regisztráció folyamatban

\*\* Ültetés előtt a gyökereket beáztatni 65 g preparát/10 l víz oldatába, vagy beöntözni 1 liter oldattal 1 méter hosszan a csemetéket a fertőzés megtörténte előtt, vagy legkésőbb az első tünetek megjelenésekor

Gyomirtás: **Kabuki 2,5 EC** - 0,8 l/ha az egyéves hajtások irtására  
mikor a gyomok 15 - 20 cm nagyságúak  
**Glifol** - 4 - 5 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)  
Ne kerüljön a gyomirtó a termesztett növényre

35

E.Sz.A.

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő  
E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás



## A SZŐLŐ VÉDELME

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
5-10 cm hosszú hajtások	szőlő feketefoltossága	<b>Mankogal 80</b>	0,25%	42
	lisztharmat – primáris fertőzési forrás	+ <b>Lunar</b>	0,2 l/ha	35
	gubacsatkák	+ <b>Abastate + Nu Film 17</b>	0,075% - 0,1% + 0,1%	28
20-30 cm hosszú hajtások	peronoszpóra	<b>Alijansa</b>	2,5 kg/ha	28** i 42*
	lisztharmat	+ <b>Lunar</b>	0,2 l/ha	35
	gubacsatkák	+ <b>Abastate + Nu Film 17</b>	0,075% - 0,1% + 0,1%	28
virágzás előtt	szőlő feketefoltossága	<b>Metod 480 SC</b>	0,3%	21** i 42*
	peronoszpóra	+ <b>Fantic M</b>	2,5 kg/ha	42
	lisztharmat	+ <b>Akord</b>	0,4 l/ha	21
	gubacsatkák, kabócák	+ <b>Elisa</b>	0,06%	21
elvirágzás	szőlő feketefoltossága	<b>Metod 480 SC</b>	0,3%	21** i 42*
	lisztharmat	+ <b>Fantic M</b>	2,5 kg/ha	42
	peronoszpóra	+ <b>Foton***</b>	0,015%	35
	szürkepenész	+ <b>Dional 500 SC</b>	1 l/ha	28
	kabócák	+ <b>Cipkord 20 EC</b>	0,03%	56
virágzás utáni második kezelés (10-14 nappal az előző után, június vége)	peronoszpóra	<b>Electis 75 WG</b>	1,8 kg/ha	28** i 42*
	lisztharmat	+ <b>Lunar</b>	0,2 l/ha	35
	szürkepenész	+ <b>Pehar</b>	2 l/ha	35
	szőlómoly	+ <b>Fobos EC</b>	0,04%	28
virágzás utáni harmadik kezelés, július közepe	peronoszpóra	<b>Mankogal 80</b>	0,25%	28** i 42*
	lisztharmat	+ <b>Akord</b>	0,4l/ha	21
	szürkepenész	+ <b>Cosavet 80-DF</b>	0,3% - 0,5%	28
	szőlómoly	+ <b>Pehar</b>	2 l/ha	35
		+ <b>Polux***</b>	0,03%	21
bogyóérés kezdete	peronoszpóra	<b>Bakarni oksihlorid 50</b>	0,5%	28
	lisztharmat	+ <b>Cosavet 80-DF</b>	0,3%-0,5%	28
	szürkepenész	+ <b>Dional 500 SC</b>	1 l/ha	28
	szőlómoly	+ <b>Polux***</b>	0,03%	21

E.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő    E.Sz.A. - előírás szerinti alkalmazás

\* borszőlőre

\*\* az asztali fajtákra

\*\*\*regisztráció folyamatban

Gyomirtás: **Kabuki** - 0,8 l/ha , hajtások és gyomok irtása  
**Glifol** - 4 - 5 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelűek)  
**Gallant super** - 1 l/ha (keskenylevelűek)  
**Bonaca** - 1 l/ha (apró szulák és vadszedér)

E.SZ.A

35


E.SZ.A

E.SZ.A



## REGIONÁLIS MENEDZSEREK

- 1 dipl.ing. Duško Vitković  
mob. 063 457 308;  
vitkovic@fitofarmacija.rs
- 2 dipl. ing. Slavica Nerac  
mob. 063 106 12 99  
nerac@fitofarmacija.rs
- 3 dipl.ing. Milan Trbojević  
mob. 063 457 351  
trbojevic@fitofarmacija.rs
- 4 dipl.ing. Dimitrije Dokić  
mob. 063 457 710  
dokic@fitofarmacija.rs
- 5 dipl.ing. Dragan Hrnjak  
mob. 063 458 150  
hrnjak@fitofarmacija.rs
- 6 dipl.ing. Lidija Mitić  
mob. 063 457 956  
mitic@fitofarmacija.rs
- 7 dipl.ing. Marko Jojić  
mob. 063 250 823  
jojic@fitofarmacija.rs
- 8 dipl.ing. Miloš Nešković  
mob. 063 109 91 84  
neskovic@fitofarmacija.rs



- 9 dr Radivoje Aćimović  
mob. 063 457 714  
acimovic@fitofarmacija.rs
- 10 dipl.ing. Veljko Joksimović  
mob. 063 457 884  
joksimovic@fitofarmacija.rs
- 11 dipl.ing. Jasmina Jeremić  
mob. 063 10404 77  
jjeremic@fitofarmacija.rs
- 12 dipl.ing. Tamara Popovic  
mob.063 457 353  
tpopovic@fitofarmacija.rs
- 13 dipl.ing. Sreten Rilak  
mob. 063 457 891  
rilak@fitofarmacija.rs
- 14 dipl.ing. Goran Petrović  
mob. 063 457 739  
gpetrovic@fitofarmacija.rs
- 15 dipl.ing. Dragana Dimkovska  
mob. 063 10404 76  
dimkovska@fitofarmacija.rs

### Az értékesítési és alkalmazási szektor munkatársai:

Osztályvezető – Darko Muminović dipl. ing. | mob. 063 10716 55; muminovic@fitofarmacija.rs  
Regionális szakmunkatárs a gyümölcsstermesztésben – dr Predrag Milovanović | mob. 063 457 819; milovanovic@fitofarmacija.rs  
Szakmunkatárs a zöldségstermesztésben – Stanoje Branković dipl. ing. | mob. 063 85000 60; sbrankovic@fitofarmacija.rs  
Szakmunkatárs a málna és burgonyatermesztésben – Radomir Đekić dipl. ing. | mob. 063 457 984; djekic@fitofarmacija.rs  
Szakmunkatárs a tápanyagutánpótlásra – Nataša Nikolić Mitić dipl. ing. | mob. 063 458 160; nnikolic@fitofarmacija.rs

**Értékesítés és alkalmazás:** Zimony, Batajnicketi drum bb, tel: 011/3072 372; 011/3072 329, fax: 011/3072 370

Értékesítési és alkalmazási szektor, Brankica Trifunović-Tišma, igazgató, tel: 011/3072 301, 063/850 0020; tisma@fitofarmacija.rs

Közép Szerbia, körzeti értékesítés, Milojica Pešić oszt.vezető, tel. 063/457 752; mpesic@fitofarmacija.rs

Az értékesítés koordinátora Vajdaság területére, Ana Pavlović tel. 063 457 364; pavlovic@fitofarmacija.rs