

NÖVÉNYVÉDELMI PROGRAM ÉS TERMÉKKATALÓGUS



Helyes út a növényvédelemben



GALENIKA - FITOFARMACIJA



▶ HAGYOMÁNY ▶ MINŐSÉG ▶ MEGBÍZHATÓSÁG



- ▶ Több, mint fél évszázada a mezőgazdaság szolgálatában.
- ▶ Szerbia legnagyobb növényvédőszer-gyártója, 25%-os piaci részesedéssel.
- ▶ 100 minőségi készítményt tartalmazó árukínálat, ebből mintegy 70 saját kifejlesztésű termék.
- ▶ Összesen 170 alkalmazott, közülük 80 különböző profilú, magas szakképesítésű (vegyész, technológus, növényvédelmi mérnök...).
- ▶ Az ISO 9001:2008 minőségi tanúsítvány követelményei szerinti, szabványosított ügyvezetési rendszer.
- ▶ Akkreditált laboratórium az SRPS ISO/IEC 17025:2006-os standard szerinti fizikai és vegyszeti kutatások lebonyolítására.
- ▶ Számítógépes rendszer irányította automatizált termelési folyamat.
- ▶ 2006. óta tartó tagság a Generikus Növényvédőszer-gyártók Európai Szervezetének.
- ▶ Felelősségteljes viszonyulás:
 - a mezőgazdasági termelők
 - a lakosság
 - a környezet iránt.





GALENIKA - FITOFARMACIJA

JAVASLAT A NÖVÉNYVÉDŐSZEREK ALKALMAZÁSÁRA

A felhasználandó növényvédőszer kiválasztásakor ügyelni kell arra, hogy azt a vegyszert válasszuk, amelyik rendeltetése szerint a legmegfelelőbb az adott helyzetben és a legkevésbé ártalmas az emberekre, illetve a környezetre nézve.

Akár hivatásszerűen foglalkozik növényvédelemmel, akár csak időnként használja ezeket a vegyszereket, kiválasztásukkor vegye figyelembe a következő körülményeket:

- A kártevők irtásakor a megfelelő agrotechnikai eljárásokat és a vegyszeres megoldásokat alkalmazza együttesen.
- A peszticidek hatékonysága az alkalmazás időpontjának helyes megválasztásától (a kártevő fejlődési szakasza, a termesztett növény fenofázisa stb.), az alkalmazás módjától, de mindenek előtt a vegyszerek helyes megválasztásától függ.
- A növényvédő szer használata előtt olvassa el az utasítást, tartsa be a felhasználási javaslatot, és a veszélyekre való figyelmeztetés szerint járjon el. Tudnia kell azt is, mi a teendő, ha baleset történik.
- A növényvédő szerek használatakor az egészségügyi-technikai óvintézkedések általános szabályait be kell tartani, védőöltözék és –eszközök segítségével óvjuk bőrünket és nyálkahártyánkat a szerekkel való érintkezéstől.
- Használat előtt ellenőrizze a permetezőt és a felszerelést, ezeknek kifogástalan technikai állapotban kell lenniük, hogy biztonságosan és pontosan működhessenek (például a porlasztó és a szelepek).
- A permetezés módjának meghatározásakor okvetlenül vegye figyelembe az időjárási körülményeket. Ellenőrizze a szél irányát és sebességét, és amennyiben a feltételek kedvezőtlennek váltak, hagyja abba a permetezést. Kerülje a vegyszerek használatát az érzékeny haszonnövények vagy a folyók közelében, amikor fennál a vegyszerszóródás veszélye. Ha elkerülhetetlenül permeteznie kell ilyen helyeken is, csökkentse a nyomást és a porlasztás sebességét. Vegye figyelembe, hogy száraz időben intenzívebb a párolgás, ami csökkenti a csöpek nagyságát és növeli a szóródás veszélyét. Permetezésre legalkalmasabb a hűvös, nedves idő és a 2 m/sec-nál nem erősebb szél.
- Továbbá vegye figyelembe a következő tényezőket is: egyazon vegyszer többszöri használata ugyanabban az évben, hasonló, vagy azonos hatású szer alkalmazása, illetve a monokultúrás termesztés, a kártevők ellenállóképességének fokozását okozhatja.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a növényvédőszerek használata után kötelező:

- elmosni a használt készülékeket, lehetőleg még a vegyszerek használatának helyszínén,
- a felhasználatlan növényvédő szert az előírásoknak megfelelő helyen kell tárolni, vagy biztonságos módon megsemmisíteni,
- a vegyszeres palackokat, csomagolóanyagokat ne használja más célra, az üreseket jól mossa el (legalább háromszor), a folyadékot öntse a permetezőgép tartályába, ezután az üres vegyszeres palackokat több helyen is szűrje ki, és csak az ilyen hulladék tárolására előlátott helyen hagyja,
- tisztítsa meg a védőfelszerelést.

Növényvédő szereink használatáról érdeklődjön a Galenika Fitofarmacia szakszolgálatánál.

Megjegyzés: A Galenika Fitofarmacia Rt. növényvédőszereit tartalmazó program áttekintése reklám- és kereskedelmi céllal készült, a benne található adatok pontosak. Mégsem vállalhatunk felelősséget az esetleges pontatlanságokért, amelyek a preparátumok nem rendeltetésszerű felhasználását okozhatják. Ezért a legjobb szándékkal azt tanácsoljuk, hogy szereink felhasználásakor és tárolásakor, akár csak más növényvédőszerek esetében, mindig tartsák be a készítményhez mellékelt használati utasítást.

A különböző típusú és formulációjú növényvédőszer- és lombtrágyák keverésének sorrendje

Mielőtt több preparátum kombinált használatáról döntene, olvassa el a használati utasítást, amely tartalmazza a készítmények keverésére vonatkozó tudnivalókat is.

Több különböző formulációjú vegyszer keveréke a következő sorrendben készíthető el:

- Kevesebb mennyiségű vízben (kisebb űrtartalmú edényben) jól elkeverjük a beáztatandó porokat – WP, vagy a vízben oldódó granulátumokat – WG, ezután folyamatos keverés mellett beöntjük a permetező tartályába, amelyet előzőleg űrtartalma egyharmadáig megtöltöttünk vízzel.
- Ezt követően, további folyamatos keverés mellett, a permetező tartályába beöntjük a koncentrált szuszpenziót – SC, amit előzőleg kis mennyiségű vízben ugyancsak előkészítettünk.
- Ezután keverjük hozzá az emulzióképző folyékony permetezőszert – EC.
- Ezt követően adhatjuk hozzá a vízzeloldható koncentrátumot – SL.
- A lombtrágyákat a végén keverjük bele.
- Végül a tartályt feltöltjük a még hiányzó vízmennyiséggel.

Az előkészített növényvédőszer-keveréket, az előírt szabályok betartásával, tanácsos minél rövidebb idő alatt elhasználni.

Amennyiben lúgus kémhatású vizet használunk, akkor a lombtrágyákat elsőként keverjük be, a többi formulációt pedig a fent leírt sorrendben adagoljuk.

PÉLDA: (az alma védelmében alkalmazható kombinációk egyike)

MANKOGAL 80 (WP)

+

PEHAR (SC)

+

HARPUN (EC)

+

FOLIGAL SUPER (lombtrágya)



Szükséges vegyszermennyiség a koncentráció és a permetező űrtartalmának függvényében

Koncentráció	A PERMETEZŐ ŰRTARTALMA (liter)							
	1	5	10	15	20	50	100	400
	SZÜKSÉGES VEGYSZERMENNYISÉG (g, ml)							
0,01 %	0,1	0,5	1	1,5	2	5	10	40
0,05 %	0,5	2,5	5	7,5	10	25	50	200
0,10 %	1,0	5,0	10	15	20	50	100	400
0,15 %	1,5	7,5	15	22	30	75	150	600
0,30 %	3,0	15	30	45	60	150	300	1200
0,50 %	5,0	25	50	75	100	250	500	2000
1,0 %	10	50	100	150	200	500	1000	4000



A BÚZA VÉDELME

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Bokrosodás	egy- és többéves széleslevelű gyomok	Monosan herbi 500 vagy Moto ekstra 850 	1,5 - 2 l/ha	E.Sz.A.**
Első szárcsomó			0,8 - 1 l/ha	E.Sz.A.**
Második szárcsomó		Moto ekstra 850	0,8 - 1 l/ha	E.Sz.A.**
A második szárcsomótól a zászlós levél megjelenéséig	levél és szárbetegségek	Akord	0,5 l/ha	E.Sz.A.**
	vetésfehérítő bogár levéltetvek	Polux vagy Fury 10 EC	0,2 - 0,3 l/ha 0,1 l/ha	35 35
	egy- és többéves széleslevelű gyomok	Tezis + Alteox T Prima	10 g/ha 0,1%	E.Sz.A.**
	egy- és többéves széleslevelű gyomok, beleértve a ragadós galajt is.	Tezis + Bonaca EC	10 g/ha 0,4 l/ha	E.Sz.A.** E.Sz.A.**
A virágzás kezdete	kalászfuzárium, a levél és a szár betegségei	Antre plus vagy Ceres	1,5 l/ha 0,4 - 0,6 l/ha	42 42
Tarlóápolás - aratás után	totális gyomirtás	Glifol 	3 - 10 l/ha	

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

 Epin ekstra  Cirkon

A KUKORICA VÉDELME

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Vetéskor a sorokban	talajlakó kártevők ellen	Fury Geo	12,5 kg/ha	E.Sz.A.**
		Tekton*	7 - 10 kg/ha	E.Sz.A.**
Vetés után, kelés előtt	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Basar + Rezon	1,4 - 1,5 l/ha 2 l/ha	E.Sz.A.** E.Sz.A.**
Kelés után a kukorica 2-5 leveles fejlődési szakaszában	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Ostap (Avalon) vagy Plamen vagy Monosan herbi 500 vagy Moto ekstra 850 	2 l/ha 0,5 - 0,7 l/ha 2 l/ha 0,8 - 1 l/ha	E.Sz.A.** E.Sz.A.** E.Sz.A.** E.Sz.A.**
	egy- és többéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Talisman + Ostap (Avalon) vagy Plamen	1 - 1,25 l/ha 2 l/ha 0,5 - 0,7 l/ha	E.Sz.A.** E.Sz.A.** E.Sz.A.**
	Kelés után a kukorica 6 leveles fejlődési szakaszáig	Talisman	1 - 1,25 l/ha	E.Sz.A.**
		Talisman + Skaut	1 l/ha 0,25 l/ha	E.Sz.A.** E.Sz.A.**
	Kelés után a kukorica 8 leveles fejlődési szakaszáig	Skaut  + Alteox wet 40	0,25 l/ha 0,5%	E.Sz.A.**

* Regisztráció folyamatban

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás



A NAPRAFORGÓ VÉDELME

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
KÁRTEVŐK IRTÁSA				
Vetéskor a sorokban	talajlakó kártevők ellen	Radar versus G	15 - 20 kg/ha	E.Sz.A.**
GYOMIRTÁS				
Vetés után, kelés előtt	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Basar + Rezon	1 - 1,2 l/ha	E.Sz.A.**
		Disk	1,5 l/ha	E.Sz.A.**
			2 - 4 l/ha	E.Sz.A.**
Levélen keresztül történő gyomirtás	fenyércirok, muhar, ujjasmuhar, perje, réti zabfű, magról kelt vadcirok	Spectrum*	0,8 l/ha	E.Sz.A.**
		vagy Rafal 120	1 l/ha	E.Sz.A.**
		vagy Globus EC	1 l/ha	E.Sz.A.**
	rizómás vadcirok, tarackbúza, tarackfű, réti perje	Spectrum*	1,3 l/ha	E.Sz.A.**
		vagy Rafal 120	1,5 - 2 l/ha	E.Sz.A.**
		vagy Globus EC	2 l/ha	E.Sz.A.**

* Regisztráció folyamatban

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

A SZÓJA VÉDELME

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
GYOMIRTÁS				
Inkorporáció	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Rampa EC	0,3 - 0,5 l/ha	E.Sz.A.**
Vetés után, kelés előtt	egyéves fűfélék és széleslevelű gyomnövények	Basar + Velton WG	1,4 l/ha	E.Sz.A.**
			0,4 kg/ha	E.Sz.A.**
Levélen keresztül történő gyomirtás, a szója és a gyomok kelése után (szója 1-3 háromleveles fejlődési szakasza)	egyéves fűfélék és széleslevelű gyomnövények	Rampa EC + Galbenon + Okvir + Alteox T Prima 	0,3 - 0,5 l/ha 2 l/ha 8 g/ha 0,1 - 0,2 l/ha	E.Sz.A.** 63 E.Sz.A.**
		Galbenon + Okvir + Kvazar	2 l/ha 8 g/ha 1 - 1,2 l/ha	63 E.Sz.A.** 35
Az első háromleveles levél megjelenésétől virágzásig	muhar, ujjas muhar, perje, réti zabfű, vadcirok magról	Spectrum* vagy Rafal 120 vagy Globus EC	0,8 l/ha 1 l/ha 1 l/ha	E.Sz.A.** E.Sz.A.** 77
	rizómás vadcirok, tarackbúza, tarackfű, réti perje	Spectrum* vagy Rafal 120 vagy Globus EC 	1,3 l/ha 1,5 - 2 l/ha 2 l/ha	E.Sz.A.** E.Sz.A.** 77

* Regisztráció folyamatban

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő



A CUKORRÉPA VÉDELME



Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)	
KÁRTEVŐK IRTÁSA					
Vetéssel egyidejű sorkezelés	talajlakó kártevők irtása	Radar versus G	15 - 20 kg/ha	E.Sz.A.**	
		Tekton	5 kg/ha	E.Sz.A.**	
Kártevők irtása vegetációban	répabarkó, káposzta-bagolylepke	Konzul	1,5 - 2 l/ha	28	
GYOMIRTÁS					
Levélen keresztül történő gyomirtás	egy- és többéves széleslevelű gyomok; mezei aszat, parlagfű, árva napraforgó, stb.	Lontrel - 100 vagy Pikogal plus + Metak 700SC + Shiro 500WG	0,6 - 1,2 l/ha	E.Sz.A.**	
			0,2 - 0,4 l/ha	E.Sz.A.**	
			1,5 - 3 l/ha	E.Sz.A.**	
			0,03 kg/ha	E.Sz.A.**	
	muhar, ujjasmuhar perje, réti zabfű, vadcirok magról,	Spektrum vagy Globus EC vagy Rafal 120	0,8 l/ha	E.Sz.A.**	
		1 l/ha	77		
	rizómás vadcirok tarackbúza, tarackfű, réti perje	Spektrum vagy Globus EC vagy Rafal 120	1 l/ha	E.Sz.A.**	
		1,3 l/ha	77		
BETEGSÉGEK KEZELÉSE					
A tünetek megjelenésének kezdetén	cerkospóras levélagya	Dakoflo 720 SC + Sekvenca	1,5 - 2 l/ha	21	
			0,4 - 0,6 l/ha	14	
	cerkospóras levélagya		Mankogal 80* vagy Dakoflo 720 SC + Antre plus	2 kg/ha	28
			1,5- 2 l/ha	21	
		1,5 l / ha	42		
		Mankogal 80* vagy Dakoflo 720 SC + Ceres	2 kg/ha	28	
		1,5- 2 l/ha	21		
		0,4-0,6 l/ha	42		

* Regisztráció folyamatban

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő



Helyes út a növényvédelemben

AZ OLAJREPCÉ VÉDELME



Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
KÁRTEVŐK IRTÁSA				
Kártevők irtása ősszel	repce-levéldarázs	Konzul vagy Polux* 	0,7 - 1 l/ha 0,3 l/ha	56 45
Kártevők irtása tavasszal	repcefénybogár	Polux*	0,3 l/ha	45
	repceszárormányosok és egyéb			
	bagolylepkék			
GYOMIRTÁS				
Inkorporáció	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Rampa EC	0,3 l/ha	E.Sz.A.**
Levélen keresztül (repce kétleveles fázisban vagy 10 - 15 cm magasság)	egy- és többéves széles-, illetve	Galera Super 	0,3 l/ha	E.Sz.A.**
		Lontrel 100 vagy Pikogal plus	0,6 - 1 l/ha	E.Sz.A.**
			0,2 - 0,3 l/ha	E.Sz.A.**
		keskenylevelű gyomnövények	Globus EC	1,5 - 2 l/ha
A MAGSZÓRÓDÁS MEGGÁTOLÁSA				
Betakarítás előtt	a magszóródás meggátolása	Nu Film 17	0,7 l/ha	

* Regisztráció folyamatban

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

A TERMŐ LUCERNA VÉDELME



Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Nyugalmi állapot (a vegetáció indulása előtt)	egyéves széleslevelű gyomnövények	Velton WG*	0,7 kg/ha	E.Sz.A.**
	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Okvir* + Alteox T Prima	15 - 20 g/ha 0,1%	E.Sz.A.***
A lucerna egytől háromleveles állapotáig	egy- és többéves széleslevelű gyomok	Galbenon 	2 - 3 l/ha	63
	egyéves széles- és keskenylevelű gyomok	Kvazar **	1 l/ha	35
	keskenylevelű gyomok	Rafal 120	1,5 l/ha	E.Sz.A.***
Az első kaszálás után	a lucernabogár és a lucernaböde lárvája	Etiol tečni **	1,5 - 2,5 l/ha	14
		Tonus 	0,25 kg/ha	28

* A lucerna egy évesnél idősebb kell hogy legyen

** Regisztráció folyamatban

***Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő



A ŐSZI ÉS TAVASZI ÁRPA VÉDELME

Alkalmazás ideje / fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Bokrosodás	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Monosan herbi ili Galbenon 	1,5 - 2 l/ha 3 l/ha	E.Sz.A.** E.Sz.A.**
Első szárcsomó	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények valamint a <i>Gallium aparine</i>	Monosan herbi + Bonaca EC	1,5 l/ha 0,4 l/ha	E.Sz.A.** E.Sz.A.**
	a levél és a szár betegségei	Antre plus	1,5 l/ha	42
A második szárcsomótól a zászlós levél megjelenéséig	a levél és a szár és a kalász betegségei, vetésfehérítő bogár lárvája, levéltetvek, tripszek	Antre plus + Polux* 	1,5 l/ha 0,2-0,3 l/ha	42 35
	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Tezis + Alteox T Prima	10 g/ha 0,1%	E.Sz.A.**
	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények, beleértve a ragadós galajt is	Tezis + Bonaca EC	10 g/ha 0,4 l/ha	E.Sz.A. E.Sz.A.**
Tarlóápolás - aratás után	totális gyomirtás	Glifol	3 - 10 l/ha	

* Regisztráció folyamatban

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

A KÁPOSZTA VÉDELME

Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Kiültetés előtt	palántadőlés	propamokarb hatóanyagú szer	15 - 20 ml / 10 vode zalivanjem	E.Sz.A.**
	keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Zanat	4 - 5 l/ha	63
	talajlakó kártevők	klórpirifosz hatóanyagú szer	20-25 kg/ha a sorokba	E.Sz.A.**
Kiültetés után	peronoszpóra káposztalepke, bolha, poloska, levél bagolylepke	Mankogal 80 + Cipkord 	2 kg/ha 0,15 - 0,3 l/ha	21 28
8 - 10 nappal a palántálás után	keskenylevelű gyomok	Rafal 120 vagy Spektrum*	0,8 - 1,2 l/ha 0,8 - 1,2 l/ha	30 42
	bolhák és tetvek	Etiol tečni	1 l/ha	21
	káposztalepke, bolha, poloska, levél bagolypille	Kozak	0,2 l/ha	14
	peronoszpóra, alternáriás betegség	Mankogal 80	2 kg/ha	21
Rozetta képződése	bagolylepkék bolha, poloska	Kozak + piriproxifén h.a. készítmény	0,2 l/ha 0,5 l/ha	21
	peronoszpóra, alternáriás betegség	+ Dakoflo 	2,5 - 3 l/ha	21
Fejképződés	peronoszpóra, alternária bakteriumos betegségek	Dakoflo + rézoxiklorid h.a. készítmény	2,5 - 3 l/ha 0,5 - 0,75%	21
	tetvek, bagolypille	+ Kozak	0,2 l/ha	14

* Regisztráció folyamatban

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

Ajánlott Nu Film 17 tapadószer hozzáadása fungicidekhez és inszekticidekhez, 0,3 l/ha dózisban.



A BURGONYA VÉDELME



Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Ültetés előtt, ültetésekor és a sorok feltöltésekor	talajlakó kártevők	Fury Geo vagy Galition ekstra vagy Radar versus G	12,5 kg/ha 20+20 kg/ha u sorokba és sorok közé, két alkalommal	E.Sz.A.** E.Sz.A.** E.Sz.A.**
Ültetés után, kelés előtt	egyéves keskeny-, illetve széleslevelű gyomnövények	Zanat Velton WG	4 l/ha 0,75 - 1,25 kg/ha	63 42
Kelés után	egyéves széleslevelű gyomnövények	Velton WG	0,5 - 0,75 kg/ha	42
A növény 15-20cm magassága a gyomnövény 2-6, illetve 3-5 leveles fázisa	egy- és többéves keskenylevelű gyomnövények	Rafal 120 vagy Spektrum*	1 - 2 l/ha 0,8 - 1,3 l/ha	E.Sz.A.** 42
	egy- és többéves széleslevelű gyomnövények	Galbenon	2 - 3 l/ha	42
Sorformálódás	peronoszpóra, alternáriás betegség	Mankogal 80 vagy Dakoflo +	2,5 kg/ha 3 l/ha	14 21
	krumplibogár	Tonus	0,25 kg/ha	14
Sorzáródás	peronoszpóra, alternáriás betegség, krumplibogár	Fuzija +	2,5 l/ha	14*
		Abastate + Nu Film 17	0,075% + 0,1%	E.Sz.A.**
A virágzás kezdete	peronoszpóra, alternáriás betegség, krumplibogár, levéltetvek	Fuzija +	2,5 l/ha	21
		Kardinal +	0,4 l/ha	7
		Asteria WG vagy Polux	70 g/ha	14
			0,3 - 0,4 l/ha	7
Teljes virágzás	peronoszpóra, alternáriás betegség, krumplibogár, levéltetvek	Alijansa vagy Fantic M +	2,5 kg/ha	21
		Sekvenca vagy Kardinal +	2,5 kg/ha	14
			0,5 l/ha	14
			0,4 l/ha	7
		Asteria WG vagy Polux	70 g/ha	14
Elvirágzás	peronoszpóra, krumplibogár, levéltetvek		0,3 - 0,4 l/ha	7
		Alijansa +	2,5 kg/ha	21
		Sekvenca vagy Kardinal +	0,5 l/ha	14
			0,4 l/ha	7
		Tonus vagy Polux	0,25 kg/ha	14
Gumóképződés	peronoszpóra	Fantic M	0,3 - 0,4 l/ha	7
Teljes beérés	peronoszpóra	Kardinal +	2,5 kg/ha	14
	Állományszárítás (deszikkálás)	Kabuki 2,5 EC ***	0,4 l/ha 0,8 l/ha	7 E.Sz.A.**

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

* Regisztráció folyamatban

*** magtermesztésnél ajánlott a gumóképződés fázisban, amikor a hozamban a magburgonyának szánt gumók dominálnak

A Sekvenca szert kombinációs partnernek ajánljuk, amikor a környezeti körülmények kedveznek az alternáriás szárazfoltosság megjelenésének.

A Kardinal szert kombinációs partnernek ajánljuk, amikor a környezeti körülmények kedveznek a burgonyavész megjelenésének.



Helyes út a növényvédelemben

A PARADICSOM VÉDELME - TERMELES PALÁNTÁRÓL



Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Kiültetés előtt	egyéves fűfélék, illetve széleslevelű gyomnövények	Zanat	4 - 5 l/ha	42
	talajlakó kártevők	Galition ekstra vagy Radar versus G vagy Fury Geo	20-25 kg/ha a sorokba 10 kg/ha a sorokba 12,5 kg/ha a sorokba	E.Sz.A.** E.Sz.A.** EE.Sz.A.**
		propamokarb h.a. szer	15-25 ml / 10 l öntözéssel	
	talajbetegségek és a palántadőlés betegsége			
Kiültetett palánta 6-8 leveles fázisában	tetvek	Dimetogal	0,075 - 0,1%	28
	peronoszpóra és alternáriás betegség	+ Dakoflo	3 l/ha	21
	lisztharmat és alternáriás betegség	+ Akord 	0,75 l/ha	21
	bakteriózis	Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50*	0,25% 0,5 - 0,75%	14 14
1-2 héttel a palántálás után	egyéves széleslevelű gyomnövények	Velton WG	0,5 - 0,75 kg/ha	42
	fűfélék	Rafal 120	0,8 - 2 l/ha	30
	peronoszpóra és alternáriás betegség	Fuzija	2,5 l/ha	21
	tetvek és bolhák	+ Dimetogal vagy Uranus*	0,075% - 0,1% 0,05%	28 3
	atkák, tripszek	Harpun	0,05-0,075%	3
	üvegházi molytetű (liszteske)	+ Polux	0,05%	7
7-10 nap után	lisztharmat és alternáriás betegség	Akord	0,75 l/ha	21
	peronoszpóra	+ Alijansa	2,5 kg/ha	21
	szürke- és fehérpenész	+ Atlas	1 kg/ha	3
Védekezés az első szedésig, betartva az ételmezés- egészségügyi várakozási időt, 7 naponként	peronoszpóra	Nukleus*	2,5 - 3 l/ha	21
	atkák	+ Abastate + Nu-Film 17	0,075% + 0,1%	3
Szedések közötti védekezés, betartva az ételmezés- egészségügyi várakozási időt	peronoszpóra, alternária, szürke-és fehérpenész tetvek atka, tripszek, aknázómoly	Promesa	0,75 l/ha	3
		+ Atlas	1 kg/ha	3
		+ Polux	0,05%	7
		+ Harpun 	0,075%	3
		+ Abastate + Nu-Film 17	0,075% + 0,1%	3
Rovarkártevők elleni védekezés szedés alatt, betartva az ételmezés-egészségügyi várakozási időt	gyapottok-bagolylepke, paradicsommoly	Triton	1,5 - 2 l/ha	3

* Regisztráció folyamatban

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

É.V.I. - ételmezés-egészségügyi várakozási idő

*** Jobb hatásfok kifejtése érdekében ajánlott a kezelést egy órával a szerek keverése után elvégezni.



A MEGGY VÉDELME



Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Vegetáció kezdete	monília, antraknózis pajzs- és levéltetvek, atkák	Bakarni oksihlorid 50 + Galmin*	0,75% 2%	E.SZ.A** E.SZ.A**
Fehérbimbós állapot (amíg a virágok 25%-a kinyílik)	monília	Galofungin T vagy Neon	0,05% 0,05%	E.SZ.A** 14
Teljes virágzás	monília	Galofungin T vagy Neon	0,05% 0,05%	E.SZ.A** 14
Elhúzódó virágzás	monília	Neon vagy Akord	0,05% 0,075%	14 21
Elvirágzás	levélfoltosság, monília levéltetvek meggyeszeleny	Galileo* + Sekvenca + Dimetogal	0,075% 0,02% 0,1%	35 E.SZ.A** 21
Növekvő termések	levélfoltosodás, monília levéltetvek ,meggyeszeleny	Mankogal 80 vagy Galileo* + Sekvenca + Radar 300 EW	0,25% 0,075% 0,02% 0,25%	21 35 E.SZ.A** 28
A termés színváltozása	termésrothadás, levélfoltosodás cseresznyelég	Mankogal 80 + Akord + Tonus*	0,25% 0,075% 0,025%	21 21 14
14 nappal a szedés előtt	termésrothadás, cseresznyelég	Neon + Polux*	0,05% 0,07%	14 14
Szedés után	levélfoltosodás atkák	Mankogal 80 + Neon + Abastate* + Nu Film 17	0,25% 0,05% 0,1% 0,03%	E.SZ.A** E.SZ.A** E.SZ.A** E.SZ.A**
Őszi, kék kezelés	monília, antraknózis levélfoltosodás	Bakarni oksihlorid 50	0,5 - 0,75%	E.SZ.A**

* Regisztráció folyamatban

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

Gyomirtás: Glifol - a gyomok 10-40 cm-esek (4 évnél idősebb ültetvényben)

2 - 4 l/ha egyéves

4 - 8 l/ha többéves gyomok esetében

Bonaca EC - 1,5 - 2 l/ha (széleslevelű gyomok, apró szulák és vadszeder)

Ne kerüljön a gyomirtó a termesztett növényre

35

35

E.Sz.A**

AZ ALMA VÉDELME



Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Rügyduzzadás	tűzelhalás, varasodás, pajzstetvek, levéltetvek és atkák petéi, bimbólikasztó	Bakarni oksihlorid 50 vagy Cuprozin 35 WP + Galmin + Cipkord 20 EC	0,5% 0,35% 2 - 3% 0,02%	E.Sz.A.** E.Sz.A.** E.Sz.A.** 28
Rügyfakadás	tűzelhalás,	Cuprozin + Bordóilé hatóanyagú szer	0,35% 0,8%	E.Sz.A.**
Egérful fázis	lisztharmat, varasodás bimbólikasztó	Pehar + Mankogal 80 + Cosavet 80-DF + Radar 300 EW	0,1% 0,25% 0,3% 0,3%	28 21 21 28
Zöldbimbós állapot	varasodás, lisztharmat levéltetvek, bimbólikasztó	Pehar + Mankogal 80 + Foton + Cosavet 80-DF + Konzul	0,1% 0,25% 0,02% 0,3% 0,1%	28 21 21 21 28
Pirosbimbós állapot	varasodás, lisztharmat, levéltetvek	Neon + Mankogal 80 + Cosavet 80-DF + Fury 	0,05-0,07% 0,25% 0,3% 0,01-0,015%	28 21 21 28
Pirosbimbós állapot - fehérbimbós állapot között	piros gyümölcsfa-takácsatka, közönséges takácsatka	Uranus + Abastate + Nu Film 17 ili Galmin	0,05% 0,07% 0,1% 0,3%	14 14 21
Virágzás kezdete	varasodás, lisztharmat	Neon + Galileo + Lunar	0,05-0,07% 0,075-0,1% 0,02%	28 35 21
Virágzás	varasodás, lisztharmat	Neon + Galileo + Foton	0,05-0,07% 0,075-0,1% 0,02%	28 35 21
Elvirágzás	varasodás, lisztharmat, levéltetvek, aknázómolyok	Sekvenca + Galileo + Konzul + Warrant 200 SL	0,02% 0,075-0,1% 0,1% 0,025%	28 35 28 14
Első kezelés virágzás után	varasodás, lisztharmat aknázómoly, levéltetvek, almamoly	Kardinal + Sekvenca + Lunar + Harpun + Tonus + Nu Film 17 	0,06% 0,02% 0,02% 0,1% 0,05% 0,1%	21 28 21 28 28



AZ ALMA VÉDELME



Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Elvirágzás utáni második kezelés	varasodás lisztharmat, almamoly, levéltetvek	Kardinal	0,06%	21
		+ Sekvenca	0,02%	28
		+ Triton*	0,25-0,3%	7
		+ Radar EW	0,25%	28
		+ Nu Film 17	0,03%	
Elvirágzás utáni harmadik kezelés	varasodás lisztharmat, levéltetvek	Kardinal	0,06%	21
		+ Sekvenca	0,02%	28
		+ Asteria WG	0,02%	21
Elvirágzás utáni negyedik kezelés	varasodás lisztharmat, almamoly	Metod 480 SC	0,3%	21
		+ Akord	0,03%	21
		+ Lunar	0,02%	21
		+ Polux	0,03-0,05%	7
Elvirágzás utáni ötödik kezelés	varasodás lisztharmat, almamoly,	Metod 480 SC	0,3%	21
		vagy Galileo	0,1%	35
		+ Akord	0,03%	21
		+ Foton	0,02%	21
		+ Tonus	0,025%	28
		vagy Warrant 200 SL	0,025%	14
Szükség esetén	atkák	Uranus	0,05%	14
		+ Abastate	0,1%	14
		+ Galmin	0,3%	21
		vagy Nu Film 17	0,1%	
Elvirágzás utáni hatodik kezelés	varasodás, lisztharmat almamoly, levéltetvek	Metod 480 SC	0,3%	21
		+ Lunar	0,02%	21
		+ Harpun	0,1%	28
		+ Asteria WG	0,02%	21
		+ Nu Film 17	0,03 %	
Elvirágzás utáni hetedik kezelés	tárolási betegségek	Flux*	0,1%	7
		+ Triton*	0,25-0,3%	7
	almamoly, alternária	+ Polux*	0,03%	7
15 nappal szedés előtt	tárolási betegségek	Flux*	0,1%	7
	almamoly, alternária	+ Polux*	0,03%	7

* Regisztráció folyamatban

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

Gyomirtás: Gallant Super - 1 - 1,5 l/ha E.Sz.A**
 Glifol - 2 - 4 l/ha egyéves gyomok 35
 4 - 8 l/ha többéves gyomok 35
 Bonaca EC - 1,5 - 2 l/ha (apró szulák és vadszeder) E.Sz.A**
 Ne kerüljön a gyomirtó a termesztett növényre



Helyes út a növényvédelemben

A KÖRTE VÉDELME



Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Nyugalmi vegetációs időszak	körte-levélbolha	Galmin + Cipkord 20 EC	3% 0,03%	E.Sz.A.** 28
Rügyduzzadás	tűzelhalás, varasodás	Bakarni oksihlorid 50	0,5-0,7%	E.Sz.A.**
Egérful fázis	varasodás körte-levélbolha	Metod 480 SC +	0,3%	21
		Konzul +	0,15%	28
		Harpun +	0,1%	28
		Nu Film 17	0,1%	
Fehérbimbós állapot	varasodás körte-levélbolha, gubacsatkák	Mankogal 80 +	0,25%	21
		Polux +	0,05%	7
		Galmin	0,5%	21
Virágzás	varasodás	Pehar* +	0,1%	28
		Mankogal 80	0,25%	21
Elvirágzás	korompenész, varasodás körte-levélbolha, gubacsatkák	Pehar*  +	0,1%	28
		Metod 480 SC +	0,3%	21
		Abastate +	0,15%	14
		Nu Film 17	0,1%	
Elvirágzás utáni első kezelés	varasodás körte-levélbolha, gubacsatkák	Mankogal 80  +	0,25%	21
		Sekvenca* +	0,02%	28
		Kulisa +	0,035%	14
		Abastate +	0,15%	14
		Nu Film 17	0,1%	
Elvirágzás utáni második kezelés	varasodás körte-levélbolha, gubacsatkák almamoly	Metod 480 SC +	0,3%	21
		Sekvenca* +	0,02%	28
		Konzul +	0,1%	28
		Nu Film 17	0,1%	



A KÖRTE VÉDELME



Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Elvirágzás utáni harmadik kezelés	varasodás körte-levélbolha	Mankogal 80	0,25%	21
		+ Harpun	0,15%	28
		+ Abastate	0,15%	14
		+ Galmin	0,3%	21
Elvirágzás utáni negyedik kezelés	varasodás, tárolási betegségek, körte-levélbolha, almamoly	Metod 480 SC	0,3%	21
		+ Galofungin T*	0,1%	14
		+ Kulisa 	0,035%	14
Elvirágzás utáni ötödik kezelés	tárolási betegségek, körte-levélbolha	Galofungin T*	0,1%	14
		vagy Flux*	1 l/ha	7
		+ Abastate	0,15%	14
		+ Kulisa	0,035%	14
15 nappal a szedés előtt	tárolási betegségek, körte- levélbolha, almamoly	+ Nu Film 17	0,1%	
15 nappal a szedés előtt	tárolási betegségek, körte- levélbolha, almamoly	Flux*	1 l/ha	7
		+ Polux *	0,05%	7
Őszi, rezes kezelés	tűzelhalás, varasodás, körte-levélbolha	Bakarni oksihlorid 50	0,5 – 0,75%	E.Sz.A.**
		+ Konzul	0,15%	E.Sz.A.**

* Regisztráció folyamatban

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

Gyomirtás: Glifol - a gyomok 10-40 cm-esek (4 évnél idősebb ültetvényben)

2 - 4 l/ha egyéves

35

4 - 8 l/ha többéves gyomok esetében

35

Bonaca EC - 1,5 - 2 l/ha (széleslevelű gyomok)

E.Sz.A.**

Ne kerüljön a gyomirtó a termesztett növényre

A SZILVA VÉDELME



Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Vegetáció kezdte előtt- rügyduzzadás	Kórokozók és kártevők áttelelő formái	Bakarni oksihlorid 50	0,5-0,75%	E.Sz.A.**
		+ Galmin	3%	E.Sz.A.**
		vagy Plavo ulje	3%	E.Sz.A.**
Virágzás kezdete (a virágok 20%-a nyitva)	monília	Neon*	0,05%	14
Teljes virágzás	monília	Neon* 	0,05%	14
Elvirágzás	peronoszpóra, monília levéllyukacsosodás szilvadarázs, levéltetvek	Akord	0,075%	21
		+ Mankogal 80	0,25%	21
		+ Dimetogal 	0,075 - 0,1%	21
Növekvő termések	szilvarozsda, levéllyukacsosodás monília, Szilvamoly, levéltetvek	Metod 480 SC	0,2 - 0,3%	21
		+ Akord	0,075%	21
		+ Polux*	0,03-0,05%	14
A termés színváltozása	termésmonília, levéllyukacsosodás szilvamoly, levéltetvek	Metod 480 SC	0,3%	21
		+ Akord	0,075%	21
		+ Radar 300 EW	0,25%	28
		+ piriproxifén hatóanyagú szer 	0,15%	
14 nappal a szedés előtt	monília, kártevők	Neon*	0,05%	14
		+ Polux *	0,03 - 0,05%	14
Őszi kék kezelés	levéllyukacsosodás, monília, peronoszpóra	Bakarni oksihlorid 50	0,5 - 0,75%	E.Sz.A.**

* Regisztráció folyamatban

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

Gyomirtás: Glifol - a gyomok 10-40 cm-esek (4 évnél idősebb ültetvényben)

2 - 4 l/ha egyéves

4 - 8 l/ha többéves gyomok esetében

Bonaca EC - 1,5 - 2 l/ha (széleslevelű gyomok)

Ne kerüljön a gyomirtó a termesztett növényre

35

35

E.Sz.A.**

AZ ŐSZIBARACK VÉDELME



Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Nyugalmi vegetációs időszak	a patogének áttelelő formái ellen	Bakarni oksihlorid 50	0,5 – 0,75%	E.Sz.A.**
Rügyduzzadás	tafrinás levélfodrosodás	Dakoflo 720 SC vagy Diziram 76 WG vagy Galileo*	0,25 – 0,35% 0,3% 0,075-0,1%	E.Sz.A.** 21 E.Sz.A.**
Rügyfakadás kezdete ("zöldpont")	tafrinás levélfodrosodás	Dakoflo 720 SC vagy Diziram 76 WG vagy Galileo* 	0,25 – 0,35% 0,3% 0,075-0,1%	E.Sz.A.** 21 E.Sz.A.**
Virágzás	monília	Neon* vagy Pehar	0,05% 2 l/ha	14 21
Elvirágzás	levéllyukacsosodás lisztharmat, monília tetvek, tripszek	Metod 480 SC + Neon* vagy Pehar + Tonus	0,2-0,3 % 0,05% 2 l/ha 0,04%	21 14 21 28
Diónagyságú termés	lisztharmat, monília levéllyukacsosodás barackmoly, tetvek, tripszek	Metod 480 SC + Akord + Harpun + Polux*	0,25% 0,075% 0,1% 0,05%	21 7 28 14
Ritkítás után	lisztharmat, monília levéllyukacsosodás barackmoly	Mankogal 80* + Akord + Dimetogal 	0,25% 0,075% 0,15-0,2%	21 7 21
15 -20 nappal a ritkítás után	levéllyukacsosodás, monília kártevők	Diziram 76 WG + Atlas* ili Flux* + Tonus* + Polux	0,3% 0,8 - 0,1 kg/ha 0,1% 0,04% 0,05 %	21 14 7 14 14
14 nappal a szedés előtt	termésmonília, barackmoly	Atlas* ili Flux* + Polux	0,8 - 0,1 kg/ha 0,1% 0,05%	14 7 14
Őszi rezes kezelés	levéllyukacsosodás tafrinás levélfodrosodása	Bakarni oksihlorid 50	0,75%	E.Sz.A.**

* Regisztráció folyamatban

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

**Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

Gyomirtás: Glifol - a gyomok 10-40 cm-esek (4 évnél idősebb ültetvényben)

2 - 4 l/ha egyéves

35

4 - 8 l/ha többéves gyomok esetében

35

Bonaca EC - 1,5 - 2 l/ha (széleslevelű gyomok)

E.Sz.A.**

Ne kerüljön a gyomirtó a termesztett növényre

A MÁLNA VÉDELME



Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
Rügyduzzadás és rügyfakadás (kötözés után)	a hajtások száradása, pajzstetvek, levéltetvek gubacskák áttelelő formái	Cuprozin 35 WP + Galmin* vagy Plavo ulje	0,35% 2% 2 - 3%	E.Sz.A.*** E.Sz.A.*** E.Sz.A.***
Levélképződés kezdete	a hajtások száradása kártető rovarok	Cuprozin 35 WP + Kozak	0,35% 0,03%	E.Sz.A.*** 28
Csúcsvirág bomlása előtt (10 - 15 cm hosszú oldalhajtások)	a hajtások száradása szürkepenész atkák, málma-vesszőszúnyog,	Sekvenca* + Pehar + Abastate + Nu Film 17	0,4 l/ha 0,2% 0,1%+0,1%	3 14 14
Közvetlen a virágzás kezdete előtt	peronoszpóra	Alijansa**	65 g / 10 l vode	E.Sz.A.***
	a hajtások száradása szürkepenész málnabogár, málma- vesszőszúnyog, bimbólikasztó	Promesa + Pehar + Kozak	0,075% 0,2% 0,03%	10 14 28
	a hajtások száradása szürkepenész	Promesa + Dional 500 SC + Atlas*	0,075% 0,2% 0,8 kg/ha	10 14 7
14 nappal a szedés előtt	a hajtások száradása szürkepenész	Promesa + Dional 500 SC + Atlas*	0,075% 0,2% 0,8 kg/ha	10 14 7
7 nappal a szedés előtt	szürkepenész	Atlas*	0,8 kg/ha	7
Közvetlen a szedés és a hajtások eltávolítása után	a hajtások száradása atkák	Akord* + Abastate + Nu Film 17 + Tonus	0,075 % 0,1%+0,1% 0,3 kg/ha	E.Sz.A.*** E.Sz.A.*** 14
	málna-gubacsszúnyog			
	a hajtások száradása	Cuprozin 35 WP	0,35 %	E.Sz.A.***
Őszi rezes kezelés levélhullás előtt	a hajtások száradása	Cuprozin 35 WP	0,35 %	E.Sz.A.***

* Regisztráció folyamatban

** Ültetés előtt a gyökereket beáztatni 65 g szer/10 l víz oldatába, vagy beöntözni 1 liter oldattal 1 méter hosszan a csemetéket a fertőzés megtörténte előtt, vagy legkésőbb az első tünetek megjelenésekor

Gyomirtás: **Kabuki 2,5 EC** - 0,8 l/ha az egyéves hajtások irtására
mikor a gyomok 15 - 20 cm nagyságúak
Glifol - 4 - 5 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelű)
Ne kerüljön a gyomirtó a termesztett növényre

35

E.Sz.A.***

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő

***Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

A SZŐLŐ VÉDELME



Alkalmazás ideje/ fejlődési fázis	Rendeltetés	Preparátum	Dózis/ koncentráció	É.V.I. (napok)
5-10 cm hosszú hajtások	szőlő feketefoltossága	Mankogal 80	0,25%	42
	lisztharmat – primáris fertőzési forrás	+ Lunar	0,2 l/ha	35
	gubacsatkák	+ Abastate + Nu Film 17	0,075% - 0,1% + 0,1%	28
20-30 cm hosszú hajtások	peronoszpóra	Alijansa	2,5 kg/ha	28** i 42*
	lisztharmat	+ Lunar	0,2 l/ha	35
	gubacsatkák	+ Abastate + Nu Film 17	0,075% - 0,1% + 0,1%	28
Virágzás előtt	szőlő feketefoltossága	Metod 480 SC	0,3%	21** i 42*
	peronoszpóra	Legat SP	0,2%	42*
	lisztharmat	+ Akord	0,4 l/ha	21
	kabócák	+ Fury 10 EC 	0,015%	28
Elvirágzás	szőlő feketefoltossága	Metod 480 SC	0,3%	21** i 42*
	lisztharmat	Legat SP	0,2%	42*
	peronoszpóra	+ Foton***	0,015%	35
	szürkepenész	+ Pehar	2 l/ha	35
	kabócák	+ Cipkord 20 EC	0,03%	56
Virágzás utáni második kezelés (10-14 nappal az előző után, június vége)	peronoszpóra	Fantic M	2,5 kg/ha	42
	lisztharmat	+ Lunar	0,2 l/ha	35
	szürkepenész	+ Pehar	2 l/ha	35
	szőlőmoly	+ Fury 10 EC	0,015%	28
Virágzás utáni harmadik kezelés, július közepe	peronoszpóra	Electis 75 WG	1,8 kg/ha	28** i 42*
	lisztharmat	+ Akord	0,4 l/ha	21
	szürkepenész	+ Cosavet 80-DF	0,3% - 0,5%	28
	szőlőmoly	+ Atlas*	0,6 - 0,8 kg/ha	35
		+ Polux*** 	0,03%	21
Bogyóérés kezdete	peronoszpóra	Bakarni oksihlorid 50	0,5%	28
	lisztharmat	Cosavet 80-DF	0,3%-0,5%	28
	szürkepenész	+ Atlas*	0,6 - 0,8 kg/ha	35
	szőlőmoly	+ Polux***	0,03%	21

É.V.I. - élelmezés-egészségügyi várakozási idő *****Előírás szerinti alkalmazás (E.Sz.A.) esetén nincs korlátozás

* borszőlőre

** az asztali fajtákra

***regisztráció folyamatban

Gyomirtás: Kabuki - 0,8 l/ha , hajtások és gyomok irtása
 Glifol - 4 - 5 l/ha, 15 - 20 cm gyomok (keskeny- és széleslevelűek)
 Gallant super - 1 l/ha (keskenylevelűek)
 Bonaca - 1 l/ha (apró szulák és vadszedér)

E.Sz.A****

35


E.Sz.A****

E.Sz.A****



REGIONÁLIS MENEDZSEREK

- 1 dipl.ing. Duško Vitković
mob. 063 457 308;
virkovic@fitofarmacija.rs
- 2 dipl. ing. Slavica Nerac
mob. 063 106 12 99
nerac@fitofarmacija.rs
- 3 dipl.ing. Milan Trbojević
mob. 063 457 351
trbojevic@fitofarmacija.rs
- 4 dipl.ing. Dimitrije Dokić
mob. 063 457 710
dokic@fitofarmacija.rs
- 5 dipl.ing. Dragan Hrnjak
mob. 063 458 150
hrnjak@fitofarmacija.rs
- 6 dipl.ing. Lidija Mitić
mob. 063 457 956
mitic@fitofarmacija.rs
- 7 dipl.ing. Ivan Tanasijević
mob. 063 250 823
tanasijevic@fitofarmacija.rs
- 8 dipl.ing. Miloš Nešković
mob. 063 109 91 84
neskovic@fitofarmacija.rs



- 9 dr Radivoje Acimović
mob. 063 457 714
acimovic@fitofarmacija.rs
- 10 dipl.ing. Jelena Karaklajić
mob. 063 457 884
karaklajic@fitofarmacija.rs
- 11 dipl.ing. Nenad Đorđević
mob. 063 457 168
djordjevic@fitofarmacija.rs
- 12 dipl.ing. Nataša Nikolić Mitić
mob. 063 458 160
nnikolic@fitofarmacija.rs
- 13 dipl.ing. Sreten Rilak
mob. 063 457 891
rilak@fitofarmacija.rs
- 14 dipl.ing. Goran Petrović
mob. 063 457 739
gpetrovic@fitofarmacija.rs
- 15 dipl.ing. Dragana Dimkovska
mob. 063 1040 476
dimkovska@fitofarmacija.rs
- 16 dipl.ing. Strahinja Jovanović
mob. 063 1040 149
sjovanovic@fitofarmacija.rs

Regionális értékesítési képviselők

Regionális értékesítési képviselő, 1. régió - Milan Kondić dipl. ing. | mob. 063 10 53 984; kondic@fitofarmacija.rs

Regionális értékesítési képviselő, 8. és 11. régió - Koviljka Teomirović dipl. Ing. | mob. 063 10 53 977; teomirovic@fitofarmacija.rs

Regionális értékesítési képviselő, 12. és 15. régió - Dalibor Dimkovski dipl.ing. | 063 457 028; dimkovski@fitofarmacija.rs

A marketing - és felhasználási szektor munkatársai

Regionális szakmunkatárs a gyümölcsstermesztésben - Predrag Milovanović | mob. 063 457 819; milovanovic@fitofarmacija.rs

Szakmunkatárs a zöldségstermesztésben - Stanoje Branković dipl. ing. | mob. 063 85000 60; sbrankovic@fitofarmacija.rs

Szakmunkatárs a málna és burgonyatermesztésben - Radomir Đekić dipl. ing. | mob. 063 457 984; djekic@fitofarmacija.rs

Szakmunkatárs Mácsva és Vajdaság területére - Nemanja Ninković dipl. ing. | mob. 063 457 353; ninkovic@fitofarmacija.rs

Szakmunkatárs a szántóföldi növénykultúrák termesztésében - Sanja Gagrčin dipl.ing. | mob. 063 863 4025; gagrcin@fitofarmacija.rs

Szakmunkatárs Mácsva területére - Stevan Marinković dipl.ing. | mob. 063 457 114; marinkovic@fitofarmacija.rs

Szakmunkatárs a gyümölcsstermesztésben - Ivan Stevanović mast. inž. | mob. 063 457 013; stevanovic@fitofarmacija.rs

Termékmenedzser - biocidek - Milan Janićić dipl.ing. | mob. 063 8500 070; janicic@fitofarmacija.rs

Szakmunkatárs biocidek alkalmazására - Staniša Kaplanović dipl.ing. | mob. 063 8500 080; kaplanovic@fitofarmacija.rs

Termékmenedzser - tapanyagellátás - Dejan Brankov dipl.ing. | mob. 063 1042 228; brankov@fitofarmacija.rs

Eladási szektor: 11080 Zemun, Batajnički drum bb; tel: 011/ 3072 372; 3072 329; fax. 3072 370

Az értékesítés koordinátora Közép-Szerbia területére - Jasmina Jeremić | tel. 063/ 104 04 77; jjeremic@fitofarmacija.rs

Az értékesítés koordinátora Vajdaság területére: Ana Pavlović | tel. 063/ 457 364; pavlovic@fitofarmacija.rs