

Asteria® WG vododisperzibilne granule

* Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i usevu duvana

AKTIVNA MATERIJA: Tiametoksam (250 g/kg preparata)

DELOVANJE: Insekticid **Asteria WG** sadrži sistemičnu aktivnu materiju tiametoksam iz grupe neonikotinoida - 4A. Nakon tretmana biljka ga brzo resorbuje preko lista i korena i transportuje u sve delove čime se omogućava dugo delovanje i visoka efikasnost. Na insekte deluje kontaktno, inhalaciono i digestivno, nakon čega dolazi do prekida prenosa nervnih impulsa. Za nekoliko sati štetni insekti prestaju sa ishranom, a nakon jednog dana dolazi do njihovog uginuća.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena billjka	Štetna vrsta	Količina primene	Vreme primene
Jabuka	zelena vaš jabuke (<i>Aphis pomi</i>) brašnasta vaš jabuke (<i>Dysaphis plantaginis</i>)	120-200 g/ha	samo tretiranjem posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija
Duvan	lisne vaši (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	600-800 g/ha	posle rasadijanja
Grašak	zelena vaš graška (<i>Acyrthosiphon pisii</i>)	160-180 g/ha	samo tretiranjem posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija (20-30% biljaka naseljeno vašima)
Paprika	zelena breskvina vaš (<i>Myzus persicae</i>)	160-180 g/ha	samo tretiranjem posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija (20-30% biljaka naseljeno vašima)
Krompir	krompirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	60-70 g/ha	od početka piljenja jaja, pa do kraja drugog larvenog stupnja
Kupus	lisna vaš kupusa (<i>Brevicoryna brassicae</i>)	160-180 g/ha	Samo tretiranjem posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija
Krstavac i paprika u zaštićenom prostoru	pamukova vaš (<i>Aphis gossypii</i>), crna repina vaš (<i>Aphis fabae</i>), zelena vaš breskve (<i>Myzus persicae</i>) bela leptirasta vaš (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	10-20 g na 100 l vode 20-30 g na 100 l vode	na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi imagi

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog moguće pojave rezistentnosti, ne sme se mešati sa insekticidima na bazi neonikotinoida.

NAPOMENA: U toku jedne godine, na istoj površini, maksimalan broj tretiranja je jednom za usev duvana, a dva puta za jabuku, grašak, papriku, krstavac, krompir i kupus.

Asteria® WG vododisperzibilne granule

* Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Krastavac	3
Grašak, paprika	7
Krompir, kupus	14
Jabuka	21
Duvan	obezbeđen vremenom primene

PAKOVANJE: 4g, 40g, 200g

