



BASAR[®]
PLUS

* Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

koncentrovana suspenzija

Sistemični, selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih, uskolisnih i širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta

AKTIVNA SUPSTANCA: S-metolahlor(312,5 g/l preparata) + terbutilazin (187,5 g/l preparata)

DELOVANJE: S-metolahlor je aktivna supstanca iz grupe hloracetamida sa najdužim rezidualnim delovanjem u zemljištu. Svojim mehanizmom delovanja inhibira čelijsku deobu u korovima tokom klijanja i početkom nicanja. Terbutilazin je aktivna supstanca iz grupe triazina. Biljke ga usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove. U korovskim biljkama dovodi do inhibicije fotosinteze što dovodi do nekroze i uginuća korova.

PRIMENA:

Gajena biljka	Količina primene	Vreme primene
Kukuruz	4-4,5 l/ha	tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka
Suncokret	3-3,5 l/ha	tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi:

Štir bljutavi	<i>Amaranthus blitoides</i>
Štir obični	<i>Amaranthus retroflexus</i>
Vijušac njivski	<i>Bilderdykia convolvulus</i>
Tarčužak obični	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Pepeljuga obična	<i>Chenopodium album</i>
Pepeljuga srcolisna	<i>Chenopodium hybridum</i>
Proso korovsko	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Tatula obična	<i>Datura stramonium</i>
Lubeničarka njivska	<i>Hibiscus trionum</i>
Dvornik ptičiji	<i>Polygonum aviculare</i>
Dvornik veliki	<i>Polygonum lapathifolium</i>
Muhar sivi	<i>Setaria glauca</i>
Muhar zeleni	<i>Setaria viridis</i>
Pomoćnica obična	<i>Solanum nigrum</i>
Sirak divljii iz semena	<i>Sorghum halepense</i>
Čistac jednogodišnji	<i>Stachys annua</i>



BASAR[®] PLUS

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

koncentrovana suspenzija

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa drugim preparatima, ali pre toga treba proveriti njihovu kompatibilnost.

NAPOMENE: Ne sme se koristiti na izrazito lakim, peskovitim zemljištima (<1% humusa), kraškim poljima i zemljištima čija je pH<5,5. Posle 5 meseci od primene mogu se sejati pšenica (uz duboko oranje), a u jesen lucerka, detelina i uljana repica. Maksimalna doza terbutilazina ne sme preći 850 g/ha. Maksimalan broj tretiranja je jednom, svake treće godine, na istoj površini.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
kukuruz, suncokret	obezbeđen vremenom primene

PAKOVANJE: 1 l, 5 l

