

Biocidni proizvod (rodenticid) za neposrednu primenu u skladištima

AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0,05 g/kg preparata)

DELOVANJE: Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije, što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

| Mesto primene | Štetna vrsta | Količina /vreme primene |
|---|--|---|
| U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom stanju) | sivi pacov (<i>Rattus norvegicus</i>) | postavljanjem mamaka, u količini 100 g po aktivnoj rupi ili gomilici, na svakih 5-7 metara |
| | kućni miš (<i>Mus musculus</i>) | postavljanje mamaka, u količini 20-25 g po aktivnoj rupi ili gomilici, na svakih 3-5 metara |

NAPOMENA: Jedna akcija suzbijanja traje 7-10 dana. Uginuće miševa nastupa posle 5 – 8 konzumiranja, a pacova posle jednog konzumiranja. Preparat se može koristiti samo u objektima, gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. Preparat je namenjen za profesionalne korisnike. Ne sme doći u dodir sa decom, prehrambenim i krmnim proizvodima. Može se koristiti više puta u toku godine, u zavisnosti od infestacije štetnih glodara. Po završetku akcije suzbijanja, ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti, spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama.

KRAJNI ROK PRIMENE (KARENCA): Obezbeđena je vremenom i načinom primene preparata.