



Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu

AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (500 g/l preparata) + cipermetrin (50 g/l preparata)

DELOVANJE: Kontaktno, inhalaciono i digestivno delovanje na insekte i sinergistički odnos dve aktivne materije obezbeđuje izuzetnu delotvornost preparata. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija, cipermetrina kao modulatora natrijumovih kanala nervnih vlakana i hlorpirifosa kao inhibitora aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata, doprinose visokoj efikasnosti u suzbijanju širokog spektra štetnih insekata u različitim razvojnim stadijumima.

SPEKTAR DELOVANJA:

Gajena biljka	Štetna vrsta	Količina/ koncentracija primene	Vreme primene
Jabuka i kruška	jabukin smotavac (<i>Cydia pomonella</i>) zelena jabukina vaš (<i>Aphis pomi</i>) crna kruškina vaš (<i>Anuraphis farfarae</i>) pepeljasta vaš (<i>Dysaphys plantaginea</i>)	0,075 – 0,1%	pre početka ubušivanja gusenica u plodove na početku formiranja prvih kolonija
Šećerna repa	repina pipa (<i>Bothynoderes punctiventris</i>) lisne sovice (<i>Mamestridae</i> i <i>Moleracea</i>)	1,5 – 2 l/ha 1 – 1,5 l/ha	na početku pojave imaga u toku masovnog piljenja gusenica, odnosno, kada su prisutni najmlađi larveni stupnjevi
Uljana repica	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)	0,75 – 1 l/ha	na početku pojave imaga

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom pesticida. Treba izbegavati mešanje sa preparatima alkalne reakcije kao i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola i drugih alkohola.

NAPOMENA: Može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes, u uslovima visoke temperature i vlažnosti. U toku jedne godine, na istoj površini maksimalno se može primeniti dva puta.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Jabuka, kruška, šećerna repa	28
Uljana repica	56

PAKOVANJE: 100 ml, 1 l