

Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra delovanja

AKTIVNA SUPSTANCA: Deltametrin (25 g/l preparata)

DELOVANJE: Deltametrin je sintetički insekticid iz grupe piretroida kojeg odlikuje veoma brz efekat delovanja na ciljane štetočine. Nakon primene dolazi do paralize nervnog sistema insekata, kroz promene napona natrijumovih kanala nervnih vlakana. Do uginuća insekata dolazi zbog nepovratnog oštećenja nervnog sistema. Polux deluje kontaktno i digestivno na sve pokretne stadijume insekata.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Štetna vrsta	Količina / koncentracija primene	Vreme primene
Strna žita	žitna pijavica (<i>Oulema melanopus</i>) biljne vaši (<i>Macrosiphum avenae</i> , <i>Metopolophium dirhodum</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Schizaphis graminium</i>)	0,2-0,3 l/ha	u vreme pojave imaga na početku formiranja prvih kolonija
Jabuka	jabukina lisna osa (<i>Hoplocampa testudinea</i>) miner okruglih mina (<i>Cemostoma scitella</i>), miner prozirnih, belih mina (<i>Lithocletis corylifoliella</i>), miner mramornih mina (<i>L. blanckarella</i>), miner zmijolikih mina (<i>Lyonetia clerkella</i>)	0,03-0,05%	pre piljenja larvi (faze 67-68 BBCH skale) u vreme leta leptira i početka piljenja gusenica
	jabukin smotavac (<i>Cydia pomonella</i>) zelena jabukina vaš (<i>Aphis pomi</i>) i pepeljaste vaši (<i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>D. devecta</i>)	0,02- 0,03%	na početku piljenja prvih gusenica na početku formiranja prvih kolonija
Kruška	obična kruškina buva (<i>Cacopsylla pyri</i>) kruškina osa (<i>Hoplocampa brevis</i>) pepeljaste vaši (<i>Dysaphis pyri</i>)	0,05% 0,03-0,05% 0,02- 0,03%	kada se registruje prisustvo štetočine pre piljenja larvi (faze 67-68 BBCH skale) na početku formiranja prvih kolonija

nastavak tabele sa prethodne strane

Gajena biljka	Štetna vrsta	Količina / koncentracija primene	Vreme primene
Breskva	biljne vaši (Aphididae)	0,03-0,05%	po pojavi prvih kolonija
	breskvin smotavac (<i>Cydia molesta</i>)	0,05%	u vreme ubušivanja gusenica u vrhove letorasta
Trešnja i višnja	biljne vaši (Aphididae)	0,03-0,05%	po pojavi prvih kolonija
	trešnjina muva (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	0,07%	u vreme pojave prvih imagi i na početku piljenja larvi
Šljiva	žuta šljivina osa (<i>Hoplocampa flava</i>), crna šljivina osa (<i>Hoplocampa minuta</i>)	0,03-0,05%	odmah posle precvetavanja
	biljne vaši (Aphididae)		pri pojavi prvih kolonija
Maslina	maslinina muva (<i>Dacus oleae</i>)	0,03-0,05%	u vreme leta muva (od sredine juna do kraja avgusta)
Vinova loza	sivi grozgov smotavac (<i>Lobesia botrana</i>)	0,03-0,04%	10-14 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja gusenica
	žuti grozgov smotavac (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)	0,05-0,07%	
Uljana repica	repičina lisna osa (<i>Athalia colibri</i>)	0,2-0,3 l/ha	na početku piljenja larvi
	repičin sjajnik (<i>Meligethes aeneus</i>)		na početku pojave u vreme obrazovanja prvih cvetnih populjaka pa do pred cvetanje
Krompir	krompirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0,3 l/ha	pre razvoja larvi četvrtog stupnja
	breskvinica lisna vaš (<i>Myzus persice</i>)	0,3-0,5 l/ha	tretiranjem na početku formiranja kolonija
Paprika	zelena stenica (<i>Nezara viridula</i>)	0,3-0,5 l/ha	po pojavi štetnih jedinki
Paradajz	bela leptirasta vaš (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,05%	kada se primeti prisustvo prvih larvi
	breskvinica lisna vaš (<i>Myzus persice</i>)	0,3-0,5 l/ha	na početku formiranja prvih kolonija
Krastavac	bela leptirasta vaš (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,05%	kada se pojave prve larve
Kukuruz	kukuruzni plamenac (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	0,4-0,5 l/ha	10-14 dana posle maksimalnog leta leptira

nastavak tabele sa prethodne strane

Gajena biljka	Štetna vrsta	Količina / koncentracija primene	Vreme primene
Duvan	podgrizajuće sovice (<i>Agrotis spp.</i>)	0,2-0,3 l/ha	pri pojavi gusenica II i III razvojnog stadijuma
	breskvina lisna vaš (<i>Myzus persice</i>)		na početku formiranja prvih kolonija
	duvanov trips (<i>Thrips tabaci</i>)		u lejama ili odmah posle rasađivanja, po pojavi tripsa
Hmelj	vaš hmelja (<i>Phordon humuli</i>)	0,04-0,06%	na početku formiranja prvih kolonija
Šumske sastojine	osa hrastovog lišća (<i>Apotimus spp.</i>), mali mrazovac (<i>Operophtera brumata</i>), žutotrba (<i>Euproctis chrysorrhoea</i>), veliki mrazovac (<i>Erranis defoliaria</i>), gubar (<i>Lymantria dispar</i>) i zeleni hrastov savijač (<i>Tortrix viridiana</i>)	0,4 l/ha + 10 l/ha nafte (D1)	tretiranje gusenica gubara I i II stupnja u vreme masovnog piljenja gusenica ostale štetočine pri maksimalnoj pojavi leptira i polaganju jaja ili u vreme piljenja larvi
Plavi patlidžan	bela leptirasta vaš (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,03-0,05 %	pri pojavi prvih imagi
Mrkva, peršun, celer, paštrnak	mrkvina muva (<i>Psila rosae</i>)	0,3 l/ha	u vreme masovnog piljenja larvi
Tikva, bundeva, tikvica, dinja, lubenica	biljne vaši (Aphididae)	0,03-0,05 %	na početku formiranja prvih kolonija
Boranija, pasulj, bob, sočivo, grašak, stočni grašak			
Salata, spanać, blitva, zelje, rukola, radić, endivija i matovilac	biljne vaši (Aphididae) lisna sovica (<i>Mamestra spp.</i>)		na početku formiranja prvih kolonija pri piljenju prvih gusenica

nastavak tabele sa prethodne strane

Gajena biljka	Štetna vrsta	Količina / koncentracija primene	Vreme primene
Cvekla	biljne vaši (Aphididae)		na početku formiranja prvih kolonija
Praziluk, vlašac	lukova muva (<i>Delia antiqua</i>)		pri maksimalnoj brojnosti muva, nađenih na žutim lepljivim trakama
Kelj, karfiol, keleraba, brokoli, prokelj, rotkva, rotkvica i slačica	pepeljasta vaš kupusa (<i>Brevicoryne brassicae</i>) kupusna sovica (<i>Mamestra brassicae</i>) kupusni moljac (<i>Plutella maculipennis</i>)	0,03-0,05 %	na početku formiranja prvih kolonija pri piljenju prvih gusenica
Jagoda	biljne vaši (Aphididae)		na početku formiranja prvih kolonija
Kajsija	biljne vaši (Aphididae) jabukin smotavac (<i>Cydia pomonella</i>)		na početku formiranja prvih kolonija pri piljenju prvih gusenica
Orah	biljne vaši (Aphididae)		na početku formiranja prvih kolonija
Kesten	kestenov smotavac (<i>Cydia splendana</i>)	0,42-0,5 l/ha	na početku piljenja prvih gusenica
Leska	biljne vaši (Aphididae) braon mramorasta stenica (<i>Halyomorpha halys</i>)	0,03-0,05% 0,4-0,5 l/ha	na početku formiranja prvih kolonija po pojavi štetnih jedinki

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa velikim brojem preparata. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora, **Bordovskom čorbom** i alkalnim preparatima. Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito različitim formulacijama, proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

PRIMENA I NAPOMENE: Zbog proširenja delovanja na sve razvojne stadijume insekata može se kombinovati sa insekticidima drugih mehanizama delovanja kao npr. **Tonus**. Zbog kratke karence u voćarstvu primenjuje se u poslednjim insekticidnim tretmanima pred berbu. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti jednom za suzbijanje jabukovog smotavca, biljnih vaši, krompirove zlatice i bele leptiraste vaši, a za ostale namene do dva puta, dok se u paprici može primeniti i tri puta u toku godine.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Plavi patlidžan, tikva, bundeva, tikvica, dinja, lubenica, jagoda, kajsija, paprika	3
Krompir, jabuka, kruška, paradajz, krastavac, praziluk, vlašac, mrkva, peršun, celer, paštrnak, boranija, pasulj, bob, sočivo, radič, grašak, stočni grašak, salata, spanać, blitva, zelje, rukola, endivija, matovilac, kelj, karfiol, keleraba, brokoli, prokelj, rotkva, rotkvica i slačica	7
Kukuruz, breskva, trešnja, višnja, šljiva, hmelj	14
Vinova loza	21
Duvan, maslina	28
Orah, leska, kesten, cvekla	30
Strna žita	35
Uljana repica	42

PAKOVANJE: 50 ml, 200 ml, 1 l, 5 l

