

**VELTON[®] WG**

vododisperzibilne granule

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje, krompira, paradajza i lucerke**AKTIVNA SUPSTANCA:** Metribuzin (700 g/kg preparata)

DELOVANJE: Velton WG je selektivni, translokacioni herbicid koji sadrži aktivnu supstancu metribuzin iz grupe 1,2,4-triazinona. Svojim delovanjem remeti procese fotosinteze kod osetljivih korovskih biljaka. Nakon aplikacije se usvaja korenom i listom i transportuje u nadzemne delove biljke. Posедуje slabiju vertikalnu pokretljivost u zemljištu što mu obezbeđuje dugotrajno delovanje.

PRIMENA:

| Gajena biljka | Količina primene | Vreme primene |
|---------------|---|---|
| Soja | 0,5 kg/ha (na zemljištima sa 3-5% humusa) 1 kg/ha (na zemljištima sa >5% humusa) | posle setve, a pre nicanja useva |
| Krompir | 0,75 kg/ha (na zemljištima sa 3-5% humusa) 1,5 kg/ha (na zemljištima sa >5% humusa) 0,5 kg/ha (na zemljištima sa 1,5-3% humusa) 0,75 kg/ha (na zemljištima sa >3%) | posle sadnje, a pre nicanja useva ili posle nicanja useva kada je krompir visine 5-10 cm (5-8 listova) (faze 15-18 BBCH skale) |
| Paradajz | 0,5 kg/ha (na zemljištima sa 1,5-3% humusa) 0,75 kg/ha (na zemljištima sa >3%) | 8-10 dana posle rasađivanja |
| Lucerka | 0,5 kg/ha (na zemljištima sa 1,5-3% humusa) 1 kg/ha (na zemljištima sa >3%) | u vreme zimskog mirovanja, samo u zasnovanoj lucerki |

SPEKTAR DELOVANJA:**Jednogodišnji širokolisni korovi:**

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Teofrastova lipica | <i>Abutilon theophrasti</i> |
| Štirovi | <i>Amaranthus</i> spp. |
| Ambrozija pelenasta | <i>Ambrosia artemisifolia</i> |
| Obična loboda | <i>Atriplex patula</i> |
| Repica crna | <i>Brassica nigra</i> |
| Tarčužak obični | <i>Capsella bursa pastoris</i> |
| Pepeljuge | <i>Chenopodium</i> spp. |
| Obična tatula | <i>Datura stramonium</i> |
| Konica obična | <i>Galinsoga parviflora</i> |
| Posunac obični | <i>Heliotropeum europeum</i> |
| Lubeničarka njivska | <i>Hibiscus trionum</i> |
| Dvornici | <i>Polygonum</i> spp. |
| Tušt obični | <i>Portulaca oleracea</i> |
| Rotkva divlja | <i>Raphanus raphanistrum</i> |
| Poljska gorušica | <i>Sinapis arvensis</i> |
| Čistac jednogodišnji | <i>Stachys annua</i> |
| Mrtva kopriva njivska | <i>Lamium purpureum</i> |
| Divlja salata | <i>Lactuca seriola</i> |
| Čestoslavica | <i>Veronica persica</i> |



VELTON® WG

vododisperzibilne granule

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U usevu soje može se mešati sa preparatom **Basar**. U usevu krompira, posle setve, a pre nicanja useva može se mešati sa preparatom **Zanat**.

PRIMENA I NAPOMENE: Predstavlja veoma dobro rešenje za suzbijanje širokolisnih korova pre nicanja useva, posebno za suzbijanje ambrozije.

Pojedine sorte krompira (Saviola, Essme, Volare, Laura, Faluka, Arrow, Arizona, Riviera...) su osetljive na tretman metribuzinom posle nicanja i može doći do fitotoksičnosti, ali i kod ostalih, posebno novih sorti osetljivost treba proveriti u sortnim karakteristikama. Da bi se izbegla mogućnost pojave ožegotina kod osetljivih sorata tretman protiv korova treba raditi posle sadnje, a pre nicanja. Ne primenjuje se u usevu paradajza iz semena.

U usevu lucerke predstavlja najbolje rešenje za suzbijanje tarčuška (hoću-neću) tokom mirovanja. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne osetljive biljke. Preparat može biti fitotoksičan ako se koristi na vrlo slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) ili na jako humusnim zemljištima (>6% humusa) zbog vezivanja sa česticama zemlje. Ne mešati sa drugim herbicidima kada se primenjuje u krompiru posle nicanja. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

KRAJNI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):

| Gajena biljka | Dani |
|-------------------|----------------------------|
| Soja, lucerka | obezbeđen vremenom primene |
| Krompir, paradajz | 42 |

PAKOVANJE: 100 g, 500 g

