

FOLIGAL MAGNEZIJUM 500

Течно ђубриво са секундарним елементима, беле боје

Врста и тип: Неорганско ђубриво са секундарним елементом

Назив у оквиру типа: Суспензија магнезијум хидроксида

Назив и садржај хранљивих материја:

Магнезијум (као MgO).....34,5%/-0,9%

Физичке особине: Суспензија, беле боје

Запреминска маса: 1,4-1,5 g/cm³

Препоручена количина, време и начин примене:

Примењује се за прихрану различитих биљних врста у воћарству, ратарству и повртарству, на земљиштима дефицитарним магнезијумом, на отвореном или у заштићеном простору.

Примењује се у следећим усевима/засадима:

- **Јабука, крушка:** 4 l/ha након опадања лисних дршки. У случају тешког дефицита поновити третман пре цветања (фаза розе пупољка). Количина воде: 500-1000 l/ha
- **Трешња, шљива:** 4 l/ha применити у фази заметања плодова, а у сличају потребе поновити третман након 10- 14 дана. Количина воде: 500-1000 l/ha
- **Јагода (на отвореном):** 1 l/ha у фази зеленог пупољка. Количина воде: 200-500 l/ha
- **Малина:** 4 l/ha на почетку цветања. Количина воде: 200-500 l/ha
- **Кукуруз:** 2-4 l/ha у фази 4 до 6 листова. Количина воде: 200 l/ha
- **Житарице:** 2-4 l/ha од фазе 2 листа до формирања првог коленца. У случају јачег дефицита поновити третман након 10-14 дана и 2 l/ha применити од фазе појаве листа заставичара до пуног цветања
- **Уљана репица:** Један третман у количини од 2-4 l/ha при порасту стабљике. У случају средњег дефицита 2-4 l/ha у фази 4 до 6 листова и при порасту стабљике. У случају тешког дефицита поновити третман након 10-14 дана. Избежавати третман у фази цветања. Количина воде: 200 l/ha
- **Кромпир:** 2-4 l/ha недељу дана након ницања свих биљака и на основу анализе петелјке приликом пуњења кртола. У случају потребе поновити третман након 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Пасуљ, грашак:** 2-4 l/ha када је усев 15 cm висине. У случају јачег дефицита поновити третман у временском интервалу од 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Мрква:** 2-4 l/ha када је биљка 15 cm. У случају јачег дефицита поновити третман након 10-14 дана. Последње третирање обавити најкасније месец дана пре вађења мркве. Количина воде: 200 l/ha
- **Салата:** 2-4 l/ha две недеље након пресађивања. У случају јачег дефицита поновити третман након 10-14 дана, али најкасније месец дана пре вађења салате. Количина воде: 500 l/ha
- **Кељ, броколи, прокељ, купус, карфиол:** 2-4 l/ha у фази 4-6 листова, а у случају јачег дефицита поновити третман након 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Шећерна репа, цвекла и бела репа:** 2-4 l/ha у фази 4-6 листова, а у случају јачег дефицита поновити третман након 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Пашњаци:** 5-7 l/ha применити 7-14 дана пре испаше. Количина воде: 200 l/ha

Време и начин примене:

Примена је фолијарна и у системима за фертигацију 1-4 пута у току године у зависности од биљне врсте у којој се примењује.

Начин руковања и складиштења:

Резервоар прскалице напунити до пола водом, додати ђубриво у резервоар, добро промешати, додавањем воде разблажити до потребне концентрације. При раду са препаратом придржавати се општих мера хигијенско-техничке заштите.

Производ складиштити у затвореној оригиналној амбалажи на тамном и проветреном месту, у просторији намењеној за чување хемијских средстава, која је заштићена од извора топлоте, влаге, у којој нема хране, пића и предмета опште употребе.

Чувати ван домашаја деце и неупућених особа.

Решење о упису у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р.Србије бр. 321-01-00764/2017-11 од 19.12.2017. године.

Рок употребе: 2 године

ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗИ: ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Батајнички друм бб
Београд-Земун
Тел: 011 3072 372



Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: GOLIĆ TRADE d.o.o.

Gradiška, ul. Romanovci bb
Bosna i Hercegovina
tel.: 051/890-200

Broj dozvole: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, R. Srpske br. 12.03.3-330-732/18 od 26.02.2018.godine.