

FOLIGAL MANGAN 500

Течно ђубриво на бази микроелемената, крем боје

Врста и тип: Неорганско ђубриво са једним микроелементом

Назив у оквиру типа: Суспензија ђубрива са манганом

Назив и садржај хранљивих материја:

Манган (Mn).....27,4%/ - 0,4%

Физичке особине: Суспензија, крем боје

Запреминска маса: 1,75-1,90 g/cm³

Препоручена количина, време и начин примене:

Примењује се за прихрану различитих биљних врста у ратарству, повртарству и воћарству, на земљиштима дефицитарним манганом, на отвореном или у заштићеном простору.

Примењује се у следећим усевима/засадима:

- **Јабука, крушка:** 1l/ha при опадању лисних дршки, а у случају тешког дефицита непосредно пред цветање. Количина воде: 500-1000 l/ha
- **Трешња, шљива:** 1l/ha у тренутку заметања плодова. У случају да је потребно поновити третман 10-14 дана касније. Количина воде: 500-1000 l/ha
- **Јагода (на отвореном):** l/ha у фази зеленог пупољка. Количина воде: 200-500 l/ha
- **Пасуљ, грашак:** 1l/ha у фази 4-6 листова (у случају дефицита приноса) и на почетку и крају цветања (када се појаве карактеристичне пеге за недостатак мангана). Количина воде: 200 l/ha
- **Кромпир:** 1 l/ha недељу дана након ницања свих биљака. У случају средњег до тешког дефицита поновити третман у временском интервалу од 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Мрква:** 1 l/ha када је биљка висине 15 cm. У случају средњег до тешког дефицита поновити третман у временском интервалу од 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Кељ, броколи, прокељ, купус, карфиол:** 1 l/ha у фази 4-6 листова. У случајевима средњег до тешког дефицита поновити третман у временском интервалу од 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Кукуруз:** 1 l/ha у фази 4-6 листова. У случајевима средњег до тешког дефицита поновити третман у временском интервалу од 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha
- **Уљана репица:** За једну апликацију 1 l/ha у фази пораста стабљике. Количина воде: 200 l/ha
- **Шећерна репа, сточна репа и бела репа:** 1 l/ha у фази 4-6 листова. У случају средњег до тешког дефицита поновити третман у интервалу од 10-14 дана. Количина воде: 200 l/ha

Време и начин примене:

Примена је фолијарна и у системима за фертигацију 1-3 пута у току године у зависности од биљне врсте у којој се примењује.

Начин руковања и складиштења:

Резервоар прскалице напунити до пола водом, додати ђубриво у резервоар, добро промешати, додавањем воде разблажити до потребне концентрације. При раду са препаратом придржавати се општих мера хигијенско-техничке заштите.

Производ складиштити у затвореној оригиналној амбалажи на тамном и проветреном месту, у просторији намењеној за чување хемијских средстава, која је заштићена од извора топлоте, влаге, у којој нема хране, пића и предмета опште употребе.

Чувати ван домашаја деце и неупућених особа.

Решење о упису у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р.Србије бр.: 321-01-00763/2017-11 од 12.12.2017. године.

Рок употребе: 2 године

Датум производње и број шарже утиснути на амбалажи.

ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗИ: ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Батајнички друм бб

Београд-Земун

Тел: 011 3072 372



Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: GOLIĆ TRADE d.o.o.

Gradiška, ul. Romanovci bb

Bosna i Hercegovina

tel.: 051/890-200

Број дозволе: Министарство пољопривреде, шумарства и водoprивреде, Р. Српске бр. 12.03.3-330-733/18 од 26.02.2018.године.