

Упутство за употребу

GALIBROM GB

Родентицид у облику расутог мамака – GB за директну примену

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна супстанца:

- Генерички назив: BROMADIOLON
- Хемијски назив: 3-[3-(4'- brom-bifenil-4-il)-3-hidroksi-1-fenil-propil]-4-hidroksi kumarin
- Садржај: 0,05 g/kg
- CAS број: 28772-56-7

ПРИМЕНА: GALIBROM GB се употребљава као антикоагулантни родентицид у складиштима пољопривредних производа, у којима роба није у расутом стању, и у објектима јавне хигијене за сузбијање:

а) сивог пацова (*Rattus norvegicus*), постављањем мамака у гомилице, у количини 100 g мамака по гомилици. Гомилице се постављају на размаку 5-7 m,

б) домаћег, кућног миша (*Mus musculus*), постављањем мамака у гомилице, у количини 20-25 g мамака по гомилици. Гомилице се постављају на размаку 3-5 m.

Поједене мамке потребно је допунити (обновити).

Постављене мамке оставити 10 – 15 дана, све док постоји и најмања активност глодара.

Активна супстанца бромадиолон, антикоагулантни родентицид II генерације. Након конзумирања мамака у организму глодара долази до инхибиције синтезе протромбина и других фактора коагулације, што доводи до крварења и угинућа глодара. Глодари угињавају најчешће у својим стаништима у периоду од 3-7 дана, најчешће након једнократног узимања мамака.

НАПОМЕНЕ:

- Мамци се не смеју постављати голом руком, већ кашичицом или неким другим предметом (метална или пластична чашица која ће се користити само за ту намену).

- Препарат не сме доћи у додир са: децом, прехранбеним производима и крмивима, домаћим животињама и кућним љубимцима.

- Ради спречавања појаве резистентности на бромадиолон, нарочито сивог пацова и кућног миша, као и могућност испољавања укрштене резистентности, повремено вршити замену са родентицидима другачијег механизма деловања, као што су фосфида.

GHS08



ОПАСНОСТ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПАСНОСТИ: Може штетно да утиче на плод. Доводи до оштећења (крв) услед дуготрајног или вишекратног излагања.

ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домашаја деце. Не удисати прашину/дим/гас/маглу/пару/спреј. Опрати руке и лице детаљно након руковања. Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом. Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштитне наочаре/ заштиту за лице. Ако дође до излагања или се сумња да је дошло до излагања: Потражити медицински савет/мишљење. Складиштити под кључем. Одлагање садржаја/амбалаже у складу са националним прописима.

Само за професионалне кориснике!

Супстанце које доприносе класификацији: *bromadiolon*

СИМПТОМИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ:

Симптоми и знаци: Прво се јављају малаксалост и брзо замарање, а најупадљивији и најозбиљнији знаци тровања су крварења. Она се најпре јављају поткожно на потколеницама, али и на слuzницама уста и коњуктива, а затим у виду хематурије и крварења из дигестивног тракта.

Прва помоћ: Обилна лаважа желуца изазивањем повраћања или преко назогастричне сонде. У случају поремећаја чинилаца коагулације протромбинског комплекса и појаве крварења примењују се препарати на бази К витамина (фитоменандион, 10 mg и.м.), трансфузије свеже смрзнуте плазме и/или крви.

У случају сумње на тровање обратити се лекару. Лекар по потреби консултује Центар за контролу тровања ВМА у Београду, Црнотравска 17, тел. (011) 2662 381 или 3608 440.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: Празну амбалажу и остатке производа не бацати у реке, језера, мора, септичке јаме, депоније, канализацију, не просипати по земљи као ни на друга места да не би дошло до загађења човекове околине.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Средство складиштити у оригиналној, добро затвореној амбалажи, на тамном месту са добром вентилацијом, одвојено од хране, пића и сточне хране и предмета за општу употребу. Држати под кључем, ван домашаја деце, нестручних особа и животиња.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ: При раду са препаратом користити заштитно одело, рукавице, наочаре и/или штитник за лице. За време рада не сме се јести, пити, нити пушити. После завршетка рада руке и лице добро опрати водом и сапуном, и истуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати. Придржавати се и других мера хигијенско-техничке заштите које препоручује произвођач.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Испражњену амбалажу потребно је снажно протрести да би што мањи садржај средства заостао у амбалажи. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. Са остацима биоцидног производа поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. Гласник РС 36/09 и 88/10, 14/16), а са искоришћеном амбалажом поступати у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. Гласник РС 36/09). **Забрањено је поновно коришћење амбалаже биоцидног производа или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да производ доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ КОД ПРЕВОЗА: Ако у току транспорта дође до расипања претпарата услед хаварије превозног средства и слично, превозник је дужан да на видљив начин означи место на коме је настало расипање препарата и да о томе одмах обавести надлежни орган санитарне инспекције или најближу станицу милиције, и да до њиховог доласка спречи приступ људи и животиња том месту. Спречити изливање препарата у водотокове и околну вегетацију прављењем баријера и засипањем земљом или песком.

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Уколико дође до расипања средства у затвореном простору, онемогућити загађење осталих производа у тој просторији засипањем земљом или песком. У оба случаја сакупити расуто средство у контејнере који ће бити уклоњени у складу са прописима за одлагање отпада.

РОК УПОТРЕБЕ: 5 година, ако се правилно складишти.

Решење о упису у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа Министарства пољопривреде и заштите животне средине Р. Србије бр.: 532-01-127/1/2010-03 од 20.04.2015. године са свим важећим изменама и допунама.

ПРОИЗВОДИ:

ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Батајнички друм бб, Београд-Земун,

тел.: 011/ 3072 372