



Kupus - proizvodnja iz semena

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Pre setve	jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi	Trefgal	1,5-2 l/ha uz inkorporaciju
Setva	bolesti poleganja rasada	Benfungin	0,1% zalivanje
	podzemne štetočine kupusar, buvači, stenice, lisne sovice	Galition G-5 Talstar 10 EC	20 - 25kg/ha u redove 0,5 l/ha
Pre nicanja	jednogodišnji travni i širokolisni korovi	Zanat ili	4 - 5 l/ha
	travni i neki širokolisni korovi	Alahlor 480	4 - 6 l/ha
Kotiledoni	bolesti poleganja rasada	Mankogal 80	0,25% zalivanje
2-3 lista	bakterioze	Bakarni oksihlorid 50	0,5 - 0,75%
	plamenjača i crna pegavost	Mankogal 80	2,5 kg /ha
	bela leptirasta vaš buvač, vaši	Elisa Dimetogal	0,025 - 0,05% 0,05 - 0,1%
	vaši, tripsi	Tonus	0,02 - 0,025%
4-6 lista	kupusar, buvač, stenice, lisne sovice	Cipkord 20 EC	0,015 - 0,03%
	uskolisni korovi	Gallant Super*	0,7 - 1 l/ha
	plamenjača i crna pegavost	Dakoflo	2,5 - 3 l/ha
Formiranje rozete	grinje, tripsi	Abastate	0,075%
	bela leptirasta vaš	Elisa	0,025 - 0,05%
	vaši, tripsi	Tonus	0,02 - 0,025%
	plamenjača i crna pegavost	Dakoflo	2,5 - 3 l/ha
Formiranje glavice	siva trulež	Dional 500 SC	0,1 - 0,2 %

* Za travne rizomske korove doza je 1,5 l/ha

Glifol	4 - 6 l/ha
Gramoxone	4 - 5 l/ha

Tretiranje pre nicanja gajene biljke, a na iznikle korove