

## Zaštita kukuruza



Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Zaštita semena	štetočine u zemljištu i u toku nicanja	<b>Furadan 35 ST</b> <b>Pozitron FS</b>	150-200ml / 10 kg sem. 60-80 ml / 10kg sem.
Posle setve, a pre nicanja	jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	<b>Acetogal Plus ili Trophy EC</b> + <b>Atrazin SC ili Tangenta SC</b>	2 l/ha 1 l/ha ili 1-1,5 l/ha
Posle nicanja do petog lista kukuruza	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	<b>Avalon</b> <b>Plamen</b> <b>Monosan herbi</b> <b>Esteron</b> <b>Moto</b>	2 l/ha 0,5 - 0,7 l/ha 2 l/ha 0,7- 1 l/ha 0,6 - 0,8 l/ha
	jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi	<b>Talisman</b> + <b>Avalon ili Plamen</b>	1 l/ha 2 l/ha ili 0,7 l/ha
Posle nicanja do šestog lista kukuruza	jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi	<b>Talisman</b>	1-1,2 l/ha
		<b>Talisman</b> + <b>Tangenta SC</b>	1 l/ha 1 l/ha
Kukuruz od nicanja do desetog lista	svi širokolisni i neki uskolisni korovi	<b>Tangenta SC</b> ili <b>Callisto 480 SC + Atplus 463</b>	1-1,5 l/ha 0,25 l/ha + 1l/ha

Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara se vrši :

**Cink - fosfid mamak** - 5 g po aktivnoj rupi, **Galibrom AB** - 10 g po aktivnoj rupi