

Crni luk iz arpadžika



Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Pre sadnje	podzemne štetočine zemljišne bolesti	Galition G-5 Balb	20-25kg/ha u redove 15 - 25 ml/10 l vode zalivanje
Pre nicanja	jednogodišnji travni i širokolisni korovi	Zanat	4-5 l/ha
2 lista	travni korovi plamenjača i lisne pegavosti vaši, tripsi, lukova muva bela leptirasta vaš	Gallant Super * Mankogal 80 Tonus Elisa	0,7-1 l/ha 2,5 kg/ha 0,02 - 0,025% 0,025-0,05%
3-4 lista	jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi jednogodišnji širokolisni korovi rđa i lisne pegavosti plamenjača, bakterioze vaši, tripsi, lukova muva grinje, tripsi, mineri bela leptirasta vaš	Lontrel 100 ** Gallant Super * Starane 250 *** Akord Bakarni oksihlorid 50 Talstar 10 EC Abastate Elisa	0,8 l/ha 0,7 - 1 l/ha 0,5 - 0,8 l/ha 0,075% 0,5-0,75% 0,02-0,05% 0,075% 0,025-0,05%
Formiranje glavice	plamenjača i lisne pegavosti bakterioze siva trulež i trulež glavica vaši, tripsi, lukova muva grinje, tripsi, mineri bela leptirasta vaš	Dakoflo Cuprozin 35 WP Dional 500 SC Tonus Abastate Elisa	2-3 l/ha 3,5 - 4 kg/ha 0,1 - 0,2 % 0,02-0,025% 0,075% 0,025-0,05%

* Za travne rizomske korove doza **Gallanta Super** je 1,5 l/ha

** Samo kad je u pitanju *Cirsium arvense* - palamida. Moguća prolazna oštećenja.

*** Samo kada su u pitanju korovi pomoćnica, tatula, ambrozija, čičak, poponac. Moguća prolazna oštećenja

Glifol ili Dominator
Gramoxone ili Galop

4 - 6 l/ha

4 - 5 l/ha

Tretiranje pre nicanja gajene
biljke, a na iznikle korove



Pravi put u zaštiti bilja