



Zaštita breskve

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Pred kretanje vegetacije (mirovanje biljaka)	kovrdžavost lista šupljikavost lista	Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP +	0,5% 0,35 %
	štitaste vaši, lisne vaši, breskvin moljac	Galmin +	1-2 %
Bubrenje pupoljaka (neposredno pred pojavu zelene tačke)	kovrdžavost lista,	Dakoflo 720 +	2,5 l/ha
	breskvin moljac pepelnica	Galmin	0,2 %
Pred cvetanje	kovrdžavost lista	Dakoflo 720 +	2,5 l/ha
	pepelnica	Thiovit Jet 80	0,3%
Cvetanje	sušenje cvetova i grančica	Kubik plus	0,25%
Precvetavanja	breskvin moljac	Dimetogal +	0,1%
	sušenje cvetova i grančica	Dional 500 SC +	0,15%
	pepelnica, sušenje cvetova i grančica	Akord	0,075%
Plod veličine lešnika	breskvin moljac	Fenitrotion 50 EC +	0,15%
	lisne vaši	Tonus +	0,025%
	šupljikavost lista	Mankogal 80 +	0,25%
	pepelnica breskve trulež plodova	Akord	0,075%
Do zrenja (prema potrebi)	breskvin moljac, lisne vaši, grinje	Fobos EC	0,05%
14 dana pred berbu	bolesti uskladištenih plodova	Dional 500 SC	0,15 %
Jesenje plavo prskanje preko 75% opalog lišća	jesenje plavo prskanje	Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP	0,75 % 0,35%

Suzbijanje korova: **Casoron G** 30 kg/ha tretiranjem u zoni reda, pre kretanja vegetacije
Gramoxone ili **Galop** 3 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni)
Glifol 4- 5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni)
Gallant Super 1 - 1,5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni)