

Zaštita crnog luka



Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Pre setve	bolesti poleganja rasada zemljišne bolesti podzemne štetočine	Galofungin T Balb Galation G-5 ili Radar versus G	0,1% zalivanje 15-25 ml/10 l zalivanje 20-25kg/ha u redove
Pre nicanja	jednogodišnji travni i širokolisni korovi	Zanat	4 - 5 l/ha
2 lista	plamenjača i lisne pegavosti vaši, tripsi, lukova muva vaši, sovice tripsi	Dakoflo Tonus Cipkord 20 EC Laser 240 SC	2 - 3 l/ha 0,02 - 0,025% 0,015 - 0,03% 0,04 - 0,05%
3-4 lista	jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi jednogodišnji širokolisni korovi plamenjača i lisne pegavosti rđa i lisne pegavosti bakterioze vaši grinje, mineri bela leptirasta vaš	Lontrel 100 ** Gallant Super * Starane 250 *** Fuzija Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50**** Dimetogal Abastate + Nu-film 17 Elisa + Tonus	0,8 l/ha 0,7 - 1 l/ha 0,5 - 0,8 l/ha 2,5 l/ha 0,075% 0,25% + 0,5% 0,05 - 0,1% 0,075% + 0,1% 0,05% + 0,05%
Formiranje glavice	plamenjača i lisne pegavosti rđa i lisne pegavosti bakterioze siva i bela trulež tripsi grinje, mineri bela leptirasta vaš, vaši	Dakoflo 720 Akord Cuprozin 35 WP Dional 500 SC Laser 240 SC Abastate + Nu-film 17 Elisa + Tonus	2 lit/ha 0,075% 3,5 - 4 kg/ha 0,1 - 0,2 % 0,04 - 0,05% 0,075% + 0,1% 0,05% + 0,05%

* Za travnate rizomske korove doza je 1.5 lit/ha

** Samo kada je u pitanju Cirsium arvense - palamida. Moguća prolazna oštećenja

*** Samo za pojedine korove (pomoćnica, čičak, ambrozija, tatula) moguća prolazna oštećenja

**** Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata

Glifol ili Dominator
Gramoxone ili Galop

4 - 6 l/ha
4 - 5 l/ha

Tretiranje pre nicanja gajene
biljke, a na iznikle korove