

Zaštita jabuke



Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Peto prskanje posle cvetanja (druga dekada juna)	čađava krastavost ploda	Galofungin 500 SC	0,05%
	pepelnica	Akord	0,03%
	grinje,	Abastate + Nu Film 17	0,075% + 0,15%
	smotavac, vaši	Fenitrotion 50 EC	0,1%
Šesto posle cvetanja (treća dekada juna)	čađava krastavost ploda	Mankogal 80	0,25%
	vaši, smotavac	Galofungin 500 SC	0,05%
	grinje	Dimetogal + Rebus	0,15% + 0,1%
		Abastate + Nu Film 17	0,075% + 0,15%
Sedmo posle cvetanja (prva polovina jula)	čađava krastavost	Dakoflo 720	0,2%
	smotavac, vaši	Tonus	0,025%
Osmo posle cvetanja (druga polovina jula)	čađava krastavost	Mankogal 80	0,25%
	smotavac, vaši	Fenitrotion 50 EC	0,1%
Deveto posle cvetanja (prva dekada avgusta)	čađava krastavost	Dakoflo 720	0,2%
	smotavac, vaši	Tonus	0,025%
Deseto posle cvetanja (treća dekada avgusta)	bolesti uskladištenih plodova	Galofungin T	0,05%
	smotavac, grinje	Actellic 50	0,1%

NAPOMENA:

* u periodu od fenofaze početka cvetanja do fenofaze plod veličine oraha, potrebno je koristiti kombinacije fungicida iz grupe triazola (Akord) i strobilurina.

Suzbijanje korova:

Casoron G 30 kg/ha tretiranjem u zoni reda, pre kretanja vegetacije
Gramoxone ili **Galop** 3 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni)
Glifol 4 - 5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni)
Gallant super 1 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni)