



Zaštita jabuke

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Otvaranje pupoljaka	plamenjača, čađava krastavost	Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP +	0,5% 0,35 %
	vaši, mrazovci, smotavci	Galmin +	1 - 2 %
		Cipkord 20 EC	0,03%
Mišje uši (početak aprila)	plamenjača, čađava pegavost	Cuprozin 35 WP +	0,35%
	pepelnica	Thiowit Jet 80 WG +	0,5%
	cvetojed, vaši, smotavac pokožice	Fobos EC	0,05%
Roze pupoljak (sredina aprila)	čađava pegavost	Pehar + Mankogal 80 +	0,1% + 0,25%
	pepelnica	Akord +	0,03%
	cvetojed, grinje	Konzul	0,1%
Početak cvetanja	čađava pegavost	Pehar + Mankogal 80 +	0,1% + 0,25%
	pepelnica	Akord +	0,03%
	cvetojed, grinje, rutava buba	Fobos EC	0,05%
cvetanje (kraj aprila)	čađava pegavost pepelnica	Pehar + Fungicid*	0,1%
Precvetavanje prvo prskanje posle cvetanja (početak maja)	čađava krastavost	Mankogal 80 +	0,25%
	pepelnica	Akord +	0,03%
	grinje, vaši	Abastate + Galmin	0,075% + 0,3%
Plod veličine lešnika 20 dana posle cvetanja (sredina maja)	čađava krastavost ploda	Dakoflo 720 +	0,2%
	pepelnica	Crystal 250 SC +	0,02%
	miner, grinje, vaši, smotavac	Dimetogal	0,15%
Plod veličine oraha (kraj maja)	čađava krastavost ploda	Mankogal 80 +	0,25%
	pepelnica	Crystal 250 SC +	0,02%
	lisni miner i grinje, vaši, smotavac	Konzul + Rebus	0,1% + 0,1%
Četvrto prskanje posle cvetanja (prva dekada juna)	čađava krastavost ploda	Dakoflo 720 +	0,2%
	pepelnica	Crystal 250 SC +	0,02%
	smotavac	Konzul	0,1%