

## Zaštita jagode



Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Pred kretanje vegetacije	siva pegavost lista	Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP	0,5% 0,35%
Pred cvetanje (vidljivi cvetni pupoljci)	siva pegavost lista	Mankogal 80 +	0,25%
	cvetojed lisne vaši grinje	Dimetogal + Abastate + Nu Film 17	0,15% 0,075% + 0,15%
Početak cvetanja	siva pegavost lista	Akord +	0,075%
	siva trulež	Dional 500 SC +	0,2%
	jagodin rilaš	Fobos EC ili Konzul	0,05% ili 0,1%
Kraj cvetanja	siva trulež	Pehar +	0,2%
	siva pegavost lista	Mankogal 80 +	0,25%
	jagodin rilaš	Tonus	0,025%
Posle berbe	siva pegavost lista	Mankogal 80 +	0,25%
	lisne vaši	Fenitrotion 50 EC	0,15%

Suzbijanje korova: **Gallant Super** - 0,8 l/ha (uskolisni jednogodišnji korovi)  
1,3 - 1,5 l/ha (uskolisni višegodišnji korovi)

Vreme primene: korovi porasta 15 - 20 cm, pre početka cvetanja jagode i posle berbe  
Posle berbe u praksi se za suzbijanje širokolisnih korova koristi  
**Monosan herbi** u dozi od 1 - 1,5 l/ha, pri čemu dnevna temperatura ne sme  
da bude veća od 25°C