



## Zaštita kruške

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Bubrenje pupoljaka	bakteriozna plamenjača, čađava krastavost i pegavost plodova	<b>Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP</b> +	0,5% 0,35%
	kruškina buva, vaši	<b>Galmin</b> +	2 - 3%
	mrazovci, cvetojedi, rutava buba	<b>Cipkord 20 EC</b>	0,03%
Početak listanja	čađava pegavost, rđa kruškina buva, grinje	<b>Mankogal 80</b> + <b>Abastate + Galmin</b>	0,25% 0,1% + 0,5 %
Pred početak cvetanja - beli baloni	čađava pegavost, rđa cvetojed, grinje, rutava buba, kruškina buva	<b>Mankogal 80</b> + <b>Pehar + Fobos EC</b>	0,25% 0,1% + 0,05%
Precvetavanje (prvo prskanje posle cvetanja)	čađava krastavost ploda, siva pegavost, rđa	<b>Dakoflo 720</b> + <b>Akord</b>	0,25% 0,03%
	grinje kruškina osa, kruškina buva	<b>Abastate + Galmin</b>	0,1% + 0,5%
Drugo posle cvetanja (7 - 10 dana posle prvog)	čađava krastavost ploda, rđa, siva pegavost	<b>Mankogal 80</b> + <b>Abastate</b> + <b>Galmin</b>	0,25% 0,1% 0,5%
	kruškina buva, grinje	<b>Dakoflo 720</b> +	0,25%
Treće posle cvetanja (10 - 12 dana posle drugog)	lisne vaši, smotavac, kruškina buva	<b>Rebus + Konzul</b>	0,1% + 0,1%
	čađava krastavost ploda, rđa kruškina buva, smotavac ploda, lisne vaši	<b>Mankogal 80</b> + <b>Tonus + Abastate</b> + <b>NU Film 17</b>	0,25% 0,05% + 0,075 % 0,15%
Peto posle cvetanja (15 - 20 dana posle četvrtog)	čađava krastavost ploda, bolesti tokom zrenja	<b>Galofungin T</b> +	0,06%
	kruškina buva, smotavac ploda, smotavac	<b>Konzul</b> +	0,1% 0,15%
		<b>NU Film 17</b>	
Šesto prskanje 20 dana posle petog (za jesenje - zimske sorte)	čađava krastavost ploda, bolesti tokom skladištenja	<b>Akord</b>	0,05%
Tretiranje tokom oktobra (osim za zimske sorte)	odrasle forme kruškine buve	<b>Konzul</b>	0,1%

Suzbijanje korova: **Casoron G** 30 kg/ha tretiranjem u zoni reda, pre kretanja vegetacije  
**Gramoxone** ili **Galop** 3 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskoliski i širokoliski)  
**Glifol** 4 - 5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskoliski i širokoliski)  
**Gallant super** 1-1.5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskoliski)