



Zaštita kupusa

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Pre sadnje	jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi	Trefgal	1,5 - 2 l/ha uz inkorporaciju
	ukolisni i širokolisni korovi	Zanat	4 - 5 l/ha
	podzemne štetočine	Radar versus G ili Galition G-5	20 - 25kg/ha u redove
Sadnja	zemljišne bolesti bolesti poleganja rasada kupusar, buvači, stenice, lisne sovice	Balb Galofungin T Fobos EC	15 - 55 ml/10 l vode 0,1% zalivanje 0,5 lit/ha
8 - 10 dana po rasađivanju	uskolisni korovi	Gallant Super *	0,7 - 1 l/ha
	buvač, vaši	Dimetogal	0,05 - 0,1%
	plamenjača i crna pegavost	Dakoflo	2 - 3 l/ha
	kupusari (veliki i mali)	Konzul	0,1 - 0,15 %
Formiranje rozete	jednogodišnji širokolisni korovi	Lontrel 100 ** Starane 250 ***	0,8 l/ha 0,5 l/ha
	grinje, tripsi	Abastate + Nu-film 17	0,075%
	lisne sovice	Rebus SC + Konzul	0,4 - 0,6 lit/ha 0,1 - 0,15%
	kupusar, buvači, stenice, plamenjača i crna pegavost	Fuzija	2,5 l/ha
Formiranje glavice	plamenjača i crna pegavost	Dakoflo	2 - 3 l/ha
	bakterioze	Bakarni oksihlorid 50	0,5 - 0,75%
	siva trulež	Dional 500 SC	0,1 - 0,2 %
	vaši, tripsi	Tonus	0,02 - 0,025%
	grinje, tripsi	Abastate + Nu-film 17	0,075% + 0,1%
	bela leptirasta vaš	Elisa	0,025 - 0,05%

U slučaju primene herbicida koji mogu izazvati privremena oštećenja (Lontrel 100 i Starane 250) potrebno je izbeći primenu neposredno posle padavina

* Za travne rizomske korove doza preparata **Gallant Super** je 1,5 l/ha

** Samo kad je u pitanju *Cirsium arvense* - palamida. Moguća prolazna oštećenja.

*** Samo za pojedine korove (pomoćnica, čičak, ambrozija, tatula, poponac) moguća prolazna oštećenja.

U slučaju mešanja preparata Lontrel 100 i Starane 250 doze primene su 0,5 + 0,5 lit/ha

Glifol ili Dominator

4 - 6 l/ha

Tretiranje pre nicanja gajene

Gramoxone ili Galop

4 - 5 l/ha

biljke, a na iznikle korove

