



## Zaštita maline i kupine\*

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Bubrenje - pucanje pupoljaka (nakon završenog vezivanja)	bolesti sušenja izdanaka	<b>Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP</b> +	0,5% 0,35%
	štitaste vaši i zimski jaja lisnih vašiju	<b>Galmin</b> + <b>Cipkord 20 EC</b>	1 - 2% 0,03%
Početak listanja	sušenje izdanaka, didimela,	<b>Mankogal 80</b> +	0,25%
	moljac i grinje	<b>Abastate + NU Film 17</b>	0,075% + 0,15%
Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova	sušenje izdanaka, didimela, smotavac,	<b>Galofungin T</b> +	0,1%
	grinje, malinina buba mušica, cvetojed	<b>Dimetogal</b> + <b>Abastate + NU Film 17</b>	0,15% 0,075% + 0,1%
Neposredno pred cvetanje	sušenje izdanaka, didimela, antraknoza siva trulež	<b>Akord</b> +	0,075%
	grinje, malinina buba mušica, cvetojed	<b>Pehar</b> + <b>Fobos EC ili Konzul</b>	0,2% 0,05% ili 0,1%
14 dana pred berbu	didimela, siva trulež	<b>Dional 500 SC</b> +	0,2%
	eriofidne grinje	<b>Elisa**</b>	0,06%
Odmah posle berbe i uklanjanja izdanaka	sušenje izdanaka, didimela,	<b>Akord</b> +	0,075%
	muva galica, mušica, grinje	<b>Abastate + NU Film 17</b>	0,075% ili 0,1%
Jesenje prskanje (pred opadanje lišća)	sušenje izdanaka, didimela	<b>Bakarni oksihlorid 50</b> ili <b>Cuprozin 35 WP</b>	0,75% 0,35

### NAPOMENA

\* kod **kupine** kada su lastari dužine 30-40cm neposredno pred cvetanje za suzbijanje prouzrokovala žute rđe koristi se **Akord** u koncentraciji 0,075%

\*\* nema opasnosti za pčele i druge oprašivače. Tretiranje obaviti u večernjim satima.

### Suzbijanje korova:

**Casoron G** 4 kg/10 ari aktivne površine, pre kretanja vegetacije  
**Gramoxone** ili **Galop** 2-3 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni)  
**Glifol** 4 - 5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni)  
**Gallant Super** 1 l/ha (uskolisni)  
**Starane 250** 1 l/ha (poponac i divlja kupina)  
 Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke