



Zaštita paprike - proizvodnja iz rasada

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Pre sadnje	jednogodišnji travni i širokolisni korovi	Zanat	4 - 5 l/ha
		Trefgal	1,5 - 3 l/ha
		Rampa EC	0,5 - 0,75 l/ha
Rasađen rasad 6-8 listova	bolesti poleganja rasada	Galofungin T	0,10%
	zemljsne bolesti	Balb	15 - 25 ml /10 l zalivanje
	podzemne štetočine	Galition G-5 ili Radar versus G	20 - 25kg/ha u redove
	tripsi	Laser 240 SC	0,04 - 0,05 %
	vaši	Dimetogal	0,05 - 0,1%
1-2 nedelje po rasađivanju	plamenjača i lisne pegavosti	Dakoflo	2,5 - 3 lit/ha
	plamenjača i lisne pegavost	Dakoflo	2,5 - 3 lit/ha
	bakterioze	Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50	0,25% + 0,5%
	travni korovi	Gallant super*	0,7 - 1 lit/ha
	tripsi	Laser 240 SC	0,04 - 0,05 %
	vaši, sovice	Cipkord 20 EC	0,015 - 0,03%
	bela leptirasta vaš, vaši	Elisa + Tonus	0,05% + 0,05%
grinje, mineri	Abastate + Nu-film 17	0,075% + 0,1%	
Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci	plamenjača i lisne pegavost	Cuprozin 35 WP	3,5 - 4kg/ha
	bakterioze	Dional 500 SC	0,1 - 0,2 %
	siva i bela trulež	Abastate	0,075%
	grinje, mineri	Fobos EC	0,02 - 0,05%
	vaši, sovice	Tonus	0,02 - 0,025%
	tripsi	Elisa	0,025 - 0,05%
	bela leptirasta vaš, vaši	Dakoflo	2 - 3 l/ha
Zaštita između berbi vodeći računa o karenci	plamenjača i lisne pegavost	Dakoflo	2,5 - 3 lit/ha
	sivai bela trulež	Dional 500 SC	0,1 - 0,2 %
	bakterioze	Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50	0,25% + 0,5%
	vaši,	Tonus	0,02 - 0,025%
	tripsi	Laser 240 SC	0,04 - 0,05 %
	grinje, mineri	Abastate + Nu-film 17	0,075% + 0,1%

* Za travne rizomske korove doza preparata Gallant Super je 1,5 l/ha

Glifol ili Dominator
Gramoxone ili Galop

4 - 6 l/ha
4 - 5 l/ha

Tretiranje pre nicanja gajene
biljke, a na iznikle korove