



Zaštita paradajza - proizvodnja iz rasada

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Pre sadnje	jednogodišnji travni i širokolisni korovi	Zanat	4-5 l/ha
	podzemne štetočine (rovci)	Galition G-5 ili Radar versus G	20-25kg/ha u redove
	zemljišne bolesti	Balb	15 - 25 ml/10l zalivanje
	bolesti poleganja rasada	Galofungin T	10 ml/10l zalivanje
Rasađen rasad 6-8 listova	vaši	Dimetogal	0,05-0,1%
	plamenjača i crna pegavost	Dakoflo	2 - 3 l/ha
	pepelnica i crna pegavost	Akord	0,075%
	bakterioze	Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50*	0,25% + 0,5%
1-2 nedelje po rasađivanju	jednogodišnji širokolisni korovi	Dancor 70 WG	0,5 - 0,75 kg/ha
	travni korovi	Gallant Super**	0,7 - 1,2 l/ha
	plamenjača i crna pegavost	Fuzija	2,5 l/ha
	vaši, buvači	Etiol tečni	0,15 - 0,2%
	grinje, tripsi, mineri	Abastate + Nu-film 17	0,075%
	bela leptirasta vaš	Elisa	0,025 - 0,05%
Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci	plamenjača i crna pegavost	Dakoflo	2,5 - 3 l/ha
	pepelnica i crna pegavost	Akord	0,075%
	bakterioze	Cuprozin 35 WP	3,5 - 4 kg/ha
	siva i bela trulež	Dional 500 SC	0,1 - 0,2 %
	tripsi, muve mineri	Laser 240 SC	0,04 - 0,05%
	vaši	Fobos EC	0,02 - 0,05%
	grinje, mineri	Abastate + Nu-film 17	0,075% + 0,1%
	bela leptirasta vaš	Elisa + Tonus	0,05% + 0,05%
Prva berba			
Zaštita između berbi vodeći računa o karenci	plamenjača i crna pegavost	Mankogal 80	2,5 kg /ha
	siva trulež	Dional 500 SC	0,1 - 0,2 %
	vaši, tripsi	Tonus	0,02 - 0,025%
	grinje, tripsi, mineri	Abastate	0,075%
	bela leptirasta vaš	Elisa	0,025 - 0,05%

* Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata

** Za travnate rizomske korove doza je 1.5-2 lit/ha

Glifol ili Dominator
Gramoxone ili Galop

4 - 6 l/ha
4 - 5 l/ha

Tretiranje pre nicanja gajene biljke, a na
iznikle korove