



Zaštita pšenice

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza
Zaštita semena	bolesti koje se prenose semenom	Mankogal S Mankogal FS Akord 025 FS Akord 060 FS	200 g/100 kg 250 ml/100 kg 150 ml/100kg 50ml/100kg
Bokorenje	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi,	Monosan herbi Esteron Moto	2 l/ha 0,8 -1 l/ha 0,7 l/ha
Prvo kolence	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, uključujući i <i>Gallium aparine</i>	Esteron + Starane 250 ili Bonaca EC	0,5 l/ha 0,5 l/ha
Drugo kolence		Mural Mural + Bonaca EC Lancelot 450 WG	20 g/ha 20 g/ha + 0,3 l/ha 33 g/ha
Pojava lista zastavičara	bolesti lista i stabla larve žitne pijavice	Antre + Fobos EC	1,5 l/ha 0,1 l/ha
	jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, uključujući i <i>Gallium aparine</i>	Tezis Starane 250 ili Bonaca EC Tezis + Starane 250 ili Bonaca EC	10 g/ha 0,4 - 1,2 l/ha 5-10 g/ha + 0,3 l/ha
Cvetanje	fuzarioza klasa i bolesti lista i stabla	Antre	1,5 l/ha
Strnište - posle skidanja useva	totalno suzbijanje svih korova	Glifol Dominator	4 - 10 l/ha

Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara se vrši :

Cink - fosfid mamak - 5 g po aktivnoj rupi, **Galibrom AB** - 10 g po aktivnoj rupi