

Zaštita uljane repice



Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
SUZBIJANJE ŠTETOČINA			
Suzbijanje štetočina u jesen	repičina lisna osa	Konzul	0,7 - 1 l/ha
	crvenoglavi repičin buvač	Fobos EC	0,15 l/ha
Suzbijanje štetočina u proleće	repičin sjajnik	Actellic 50	0,5 - 1 l/ha
	repičina pipa i dr. podgrizajuće sovce	Fobos EC	0,1 - 0,2 l/ha
SUZBIJANJE KOROVA			
Inkorporacija	jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Trefgal + Rampa EC	1 - 1,5 l/ha 0,3 l/ha
Folijarno (repica u fazi 2 lista ili 10 - 15 cm visine)	jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Lontrel 100 ili Pikogal Plus + Gallant Super ili Globus	0,6-1l/ha / 0,2-0,3l/ha 0,5-1,2l/ha / 1,5-2l/ha
Pred žetvu	desikacija	Reglone Forte	3 - 4 l/ha
SUZBIJANJE BOLESTI			
Preventivno	plamenjača, mrka pegavost lista	Mankogal 80	2,5 kg/ha
Pred pojavu simptoma	bela trulež	Dional 500 SC ili Galofungin	2 l/ha 0,6 l/ha
Pred vršidbu	sprečavanje rasipanja semena	Nu Film 17	0,7 l/ha
SUZBIJANJE GLODARA			
Tokom cele vegetacije	suzbijanje glodara	Cink - fosfid mamak Galibrom AB	5 g po aktivnoj rupi 10 g po aktivnoj rupi

Napomena: Kod svih biljnih vrsta koje imaju pojačanu voštanu prevlaku na listu preporučujemo upotrebu pomoćnog sredstva **Nu Film 17** u koncentraciji od 0,15%, zbog povećanog stepena prijajanja, produžavanja delovanja i boljeg prodiranja pesticida u biljno tkivo.