



## Zaštita vinove loze

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Lastari dužine 5 - 10 cm	crna pegavost	<b>Mankogal 80</b> +	0,25%
	pepelnica (primarni izvor zaraze), eriofidne grinje	<b>Thiovit Jet 80 WG</b>	0,6%
Pred cvetanje	plamenjača	<b>Electis 75 WG*</b> +	1,5 - 1,8 kg/h
	pepelnica - primarni izvor zaraze eriofidne grinje	<b>Akord</b> + <b>Abastate + Nu Film 17</b>	0,04% 0,075% + 0,15%
Precvetavanje	plamenjača	<b>Electis 75 WG*</b> +	1,5 - 1,8 kg/h
	pepelnica siva trulež cikade, eriofidne grinje	<b>Crystal 250 SC</b> + <b>Dional 500 SC</b> + <b>Elisa</b>	0,02% 0,15% 0,06%
Drugo tretiranje posle cvetanja, 15 dana nakon prethodnog (kraj juna)	plamenjača	<b>Mankogal 80*</b> +	0,25%
	pepelnica groždani moljac	<b>Crystal 250 SC</b> + <b>Konzul</b>	0,02% 0,15%
Treće tretiranje posle cvetanja, (polovinom jula)	plamenjača	<b>Bordovska čorba 100 SC ili</b> <b>Bakarni oksihlorid 50 ili</b> <b>Cuprozin 35 WP</b> +	2,5% 0,5% 0,35
	pepelnica groždani moljac	<b>Akord</b> + <b>Fobos EC</b>	0,04% 0,04%
Početak šarka	plamenjača	<b>Mankogal 80</b> +	0,25%
	pepelnica siva trulež groždani moljac	<b>Thiovit Jet 80 WG</b> + <b>Dional 500 SC</b> + <b>Tonus</b>	0,6% 0,15% 0,025t%
Pred berbu	siva trulež	<b>Dional 500 SC</b>	0,15%

**NAPOMENA**

\* koristi se sa fungicidima sistemičnog delovanja

Suzbijanje korova:

**Casoron G** 5 kg/10 ari aktivne površine, pre kretanja vegetacije  
**Gramoxone** ili **Galop** 2-3 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskoliski i širokoliski)  
**Glifol** 4 - 5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskoliski i širokoliski)  
**Gallant Super** 1l/ha (uskoliski)  
**Starane 250** 1 l/ha (poponac i divlja kupina)  
 Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke