



Zaštita višnje i trešnje

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza/ koncentracija
Kretanje vegetacije	monilija, antraknoza	Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP	0,5% 0,35%
	štitaste i lisne vaši, mrazovci, grinje i savijači pupoljaka	Galmin	1 - 2%
Beli baloni	monilija, antraknoza	Kubik plus	2,5 l/ha
Puno cvetanje*	monilija, antraknoza	Kubik plus	2,5 l/ha
Precvetavanje	monilija, antraknoza, pegavost lista višnje	Akord	0,075%
	grinje, minerali vaši	Abastate + Nu Film 17 Dimetogal	0,1% + 0,15% 0,1%
Plodovi u porastu, 10-12 dana kasnije	antraknoza, pegavost lista	Mankogal 80	0,25%
	trešnjina muva grinje, tripsi, minerali	Cipkord 20 EC Abastate + Nu Film 17	0,03% 0,1% + 0,15%
Plodovi u porastu, promena boje ploda	antraknoza, pegavost lista, trulež plodova	Mankogal 80 Dional 500 SC	0,25% 0,15%
	vaši	Tonus	0,025%
7 - 14 dana pred berbu	protiv pucanja plodova	Nu Film 17	0,5%
Posle berbe	pegavost lista višnje Eriofidne grinje	Mankogal 80 Abastate + Nu Film 17	2,5 kg/ha 0,1%+0,15%
Jesenje plavo prskanje preko 75% opalog lišća	Monilija, antraknoza, pegavost lista višnje	Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP	0,75% 0,35 %

NAPOMENA * Kada cvetanje traje duže od 5 dana, poželjno je izvršiti i ovaj tretman za suzbijanje monilije

Suzbijanje korova: **Casoron G** 30 kg/ha tretiranjem u zoni reda, pre kretanja vegetacije
Gramoxone ili **Galop** 3 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisi i širokolisi)
Glifol 4 - 5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisi i širokolisi)
Gallant super 1 - 1.5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisi)