



FUNGICID

# Duplex<sup>®</sup> pro



koncentrovana  
suspenzija

NOVO

**Aktivne materije:** protiokonazol (150 g/l)  
azoksistrobin (250 g/l)

FUNGICID



- ➔ aktivna materija: protiokonazol (150 g/l) i azoksistrobin (250 g/l)
- ➔ sadrži kombinaciju dve aktivne materije sistemičnog načina delovanja
- ➔ uspešno suzbija najznačajnije bolesti pšenice, kao i pegavost lista šećerne repe
- ➔ doza primene 0,8 l/ha

Pokazuje visoku efikasnost u suzbijanju biljnih bolesti, a kombinacija dve a.m. pruža maksimalnu zaštitu useva pšenice i šećerne repe.

Gajena biljka	Patogen	Količina primene	Vreme primene
Pšenica	pepelnica ( <i>Blumeria graminis</i> ) fuzarioza klasa ( <i>Fusarium spp.</i> )	0,8 l/ha	kada postoje uslovi za zaražavanje tokom fenofaze cvetanja (faze 61-65 BBCH skale)
Šećerna repa	pegavost lista ( <i>Cercospora beticola</i> )	0,8 l/ha	preventivno, tokom intenzivnog porasta, po pojavi prvih simptoma, a pre ostvarivanja uslova za širenje oboljenja (faze 39-49 BBCH skale)

U biološkim ispitivanjima efikasnost fungicida Duplex pro u suzbijanju patogena *Cercospora beticola* u odnosu na standard bila je veća na lokalitetima za:

Indija	2,75%	Kukujevci	3,5 %
Bačko Dobro Polje	4,49%	Stari Banovci	2,82%

**Standard:** ciprokonazol+azoksistrobin