



INSEKTICID

Suzbijanje paradajzovog moljca (*Tuta absoluta*)

INSEKTICID



Tuta absoluta
gusenica

Tuta absoluta
na plodu

- ➔ Paradajzov moljac (*Tuta absoluta*) poslednjih nekoliko godina uz belu leptirastu vaš, tripse i pamukovu sovicu spada u štetočine koje prouzrokuju najveće štete u paradajzu
- ➔ Štetočina živi u središnjem delu lista između lica i naličja, hrani se lisnim tkivom i pravi hodnike ili mine, a vremenom dolazi do potpunog propadanja lista, ubušuje se u stablo, vršne grane i plodove
- ➔ Na površinama gde dođe do prenamnožavanja štete mogu biti 80-100%
- ➔ Preparat **Triton** pripada grupi avarmekтина ima odlično delovanje na insekte iz roda Lepidoptera, sistemičan je deluje kontaktno i digestivno
- ➔ Ubrzo nakon primene, insekti prestaju da se hrane, a nakon toga dolazi do parlice dok uginuće nastaje za 2-4 dana.



Triton se primenjuje dva puta u intervalu od 7 dana. Veoma je važno prilikom primene preparata ne smanjivati preporučene doze primene ili utrošak vode. **Triton** se koristi u dozi 2 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!