



# Akord<sup>®</sup> WG

vododisperzibilne granule

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

## Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi i paradajzu

**AKTIVNA SUPSTANCA:** Tebukonazol (250 g/kg preparata)

**DELOVANJE:** Tebukonazol je sistemični fungicid. Deluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Probojem kroz biljno tkivo, inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Najbolja efikasnost obezbeđuje se preventivnom primenom, odnosno neposredno nakon stvaranja uslova za ostvarivanje infekcije.

### SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Patogen	Količina primene	Vreme primene
Višnja, šljiva	sušenje cvetova i rodnih grančica i mrka trulež plodova ( <i>Monilinia laxa</i> )	0,75 kg/ha	od fenofaze cvetnog balona (faza 59 BBCH skale) do punog cvetanja (faza 65-67 BBCH skale) ili početkom cvetanja (faze 61-63 BBCH skale), ukoliko se tretira samo jednom
Vinova loza	pepelница ( <i>Uncinula necator</i> )	0,4 kg/ha	pre pojave bolesti, kada su razvijena 3-4 lista (faza 13-14 BBCH skale), a najkasnije po pojavi prvih simptoma
Paradajz	crna pegavost ( <i>Alternaria solani</i> )	0,75 kg/ha	tokom vegetacije (faze 19- 71 BBCH skale), preventivno, a najkasnije pre sticanja uslova za širenje bolesti
Malina	kestenjata pegavost izdanaka ( <i>Xenodydimella applanata</i> )	0,75 kg/ha	preventivno, tokom intenzivnog porasta izbojaka pa do početka cvetanja (do faze 61 BBCH skale)

**MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:** Preparat se kombinuje sa velikim brojem jedinjenja. Iako nema podataka o nekompatibilnosti, pre njihovog mešanja sa drugim preparatima posebno različitim formulacijama, treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

**NAPOMENA:** U toku jedne godine, na istom terenu, maksimalno se može primeniti tri puta.

### KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Višnja, šljiva, vinova loza, paradajz, malina	21

**PAKOVANJE:** 10 g