



# Balb<sup>®</sup>

koncentrovani rastvor

® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

## Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u povrtarstvu i cvečarstvu

**AKTIVNA SUPSTANCA:** Propamokarb-hidrohlorid (722 g/l preparata)

**DELOVANJE:** Balb je sistemski fungicid koji sadrži aktivnu supstancu propamokarb-hidrohlorid iz grupe karbamata. Zahvaljujući dobrom usvajanju putem korena, kao i izraženoj transportabilnosti ksilemom u nadzemne delove, preparat Balb predstavlja osnovu zaštite rasada povrća od gljivičnih prouzrokovaca bolesti. Svoj mehanizam delovanja ispoljava inhibicijom sinteze fosfolipida i masnih kiselina, što ometa formiranje ćelijskih membrana gljive i dovodi do njihovih uginuća.

### SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Patogen	Koncentracija primene	Vreme primene
Paprika	plamenjača ( <i>Phytophthora capsici</i> )	0,25 %	Prvo tretiranje zalivanjem rasada 3 dana pre rasađivanja, drugo zalivanjem odmah nakon rasađivanja i treće tri nedelje nakon drugog tretiranja
Krastavac	plamenjača ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	0,15 %	tretiranjem od pojave prvih pravih listova kod kornišona, a kod salata najkasnije po pojavi prvih simptoma
Tikva, tikvica, bundeva, dinja, lubenica*			preventivno tokom vegetacije, najkasnije po pojavi prvih simptoma
Lala (lukovice i rasad)	poleganje rasada ( <i>Pythium spp.</i> )	0,3 %	potapanje očišćenih lukovica u rastvor u trajanju od 15-20 minuta ili zalivanjem posađenih lukovica i ponika

\* U toku je proces registracije

**MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:** Može se mešati sa svim protektivnim i sistemskim fungicidima za suzbijanje plamenjače.

**PRIMENA I NAPOMENE:** U praksi se za zalivanje rasada povrća fungicidima najčešće koristi 2-3 l vode po 1 m<sup>2</sup>. Ukoliko se koristi registrovana koncentracija primene 0,25%, to znači da se u 10 litara vode dodaje 25 ml preparata Balb i tim rastvorom se zalije 3-5 m<sup>2</sup> rasada.

Ne sme se primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. Kod pravilne primene nema pojave fitotoksičnosti. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti četiri puta u usevima krastavca, tikve, tikvice, bundeve, dinje i lubenice, tri puta u usevu paprike i dva puta u ukrasnom bilju.

### KRAJNI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Krastavac, tikva, tikvica, dinja, bundeva, lubenica	14
Paprika	35
Lala	obezbeđen vremenom primene

**PAKOVANJE:** 100 ml