

Lokalsistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice i skladišnih bolesti u zasadu jabuke.

AKTIVNA SUPSTANCA: Trifloksistrobin (500 g/l preparata)

DELOVANJE: Trifloksistrobin spada u grupu strobilurina, koja ima kompleksan mehanizam delovanja. Deluje na mitohondrijalnu respiraciju kod gljiva. Trifloksistrobin je inhibitor kompleksa III u respiratornom lancu. Respiracija ili disanje je proces pri kome se stvara neophodna energija za važne životne procese gljiva. Ukoliko se inhibira proces stvaranja energije, sprečava se klijanje spora, pa na taj način patogen ne može da izvrši infekciju.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Patogen	Količina primene	Vreme primene
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0,1-0,15 l/ha	u toku vegetacije preventivno, pre pojave simptoma oboljenja (faze 11/54-81 BBCH skale)
	skladišne bolesti (<i>Monilinia fructigena</i> , <i>Penicillium</i> spp.)		u fazi tehnološke zrelosti plodova (faze 81-87 BBCH skale), a najkasnije 14 dana pred berbu
Breskva*	pepelnica (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	0,1-0,15 l/ha	od fenofaze precvetavanja (BBCH 69), a najkasnije 7 dana pred berbu

*U toku je proces registracije

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima, posebno različitih formulacija proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini može se primeniti najviše četiri puta u toku vegetacije u zasadu jabuke (dva puta za pepelnicu i dva puta za skladišne bolesti) i najviše 3 puta u zasadu breskve, sa razmakom između tretiranja od 10 do 14 dana.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Breskva	7
Jabuka	14

PAKOVANJE: 1 l