



# Cipkord®

20 EC

koncentrat za emulziju

® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

## Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja

**AKTIVNA SUPSTANCA:** Cipermetrin (200 g/l preparata)

**DELOVANJE:** Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana, cipermetrin, kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida, prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa, usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. Ovaj insekticid deluje kontaktim putem na pokretne stadijume insekata. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja.

### SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Štetna vrsta	Količina/ koncentracija primene	Vreme primene
Jabuka	jabukin smotavac ( <i>Cydia pomonella</i> )	0,015-0,02 %	- prvi tretman 7-12 dana posle maksimalno uhvaćenih leptira feromonskim klopkama - drugi tretman, na početku piljenja prvih gusenica
Kruška	obična kruškina buva ( <i>Cacopsylla pyri</i> )		posle cvetanja, kada se registruje prisustvo jedinki
Vinova loza	žuti grozdov smotavac ( <i>Eupoecillia ambiguella</i> ) sivi grozdov smotavac ( <i>Lobesia botrana</i> )	0,015-0,03 %	- prvi tretman 10-14 dana posle maksimalno uhvaćenih leptira feromonskim klopkama - drugi tretman, na početku piljenja gusenica
Krompir	krompirova zlatica ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	0,15-0,3 l/ha	pri masovnom piljenju larvi, a pre razvoja larvi četvrtog stupnja (larve L1-L3)
Krastavac i paradajz u polju	bela leptirasta vaš ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	0,02-0,03 %	pri prvoj pojavi štetočina
Kupus, kelj, karfiol, keleraba, rotkvica	lisne sovice ( <i>Mamestra spp.</i> ) veliki kupusar ( <i>Pieris brassicae</i> )		
Šećerna repa	lisne sovice ( <i>Mamestra spp.</i> ) sovica gama ( <i>Autographa gama</i> )	0,15-0,3 l/ha	u toku masovnog piljenja gusenica, a pre razvoja gusenica petog stupnja (larve L1-L4)



# Cipkord<sup>®</sup>

20 EC

koncentrat za emulziju

\* Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

## Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja

**MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:** Treba izbegavati mešanje ovog preparata sa preparatima izrazito bazne reakcije. Preparat se može mešati sa velikim brojem insekticida sa drugačijim mehanizmom delovanja u cilju poboljšanja efekta i smanjenja razvoja rezistentnosti štetnih insekata.

**NAPOMENA:** Tretiranje treba vršiti dok su masovno prisutni najmlađi larveni stupnjevi. Stariji larveni stupnjevi (larve četvrtog i petog stupnja) nisu dovoljno osetljive na ovaj preparat primenjen u preporučenim količinama. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta u zasadu jabuke, vinove loze i usevima šećerne repe, kupusa, kelja, karfiola, kelerabe, rotkvice, a jednom za ostalu primenu.

### KRAJNI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Vinova loza	56
Šećerna repa	35
Jabuka, kruška, kupusnjače	28
Krompir, krastavac, paradajz	14

**PAKOVANJE:** 50 ml, 100 ml, 1 l