

Ecothrin® 5 SC

koncentrovana suspenzija

NOVO

® Zaštićena robna marka kompanije VIORYL S.A.

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, namenjen za primenu u svevima paradaja i plavog patlidžana u zaštićenom prostoru, kao i u ukrasnom bilju.

AKTIVNA SUPSTANCA: Piretrin - ekstrakt iz *Chrysanthemum cinerariaefolium* (50 g/l preparata)

DELOVANJE: Piretrini su prirodni estri hrizantemske i piretrinske kiseline, i alkohola piretrolona i cinerolona (3A; IRAC). Piretrin je prirodna supstanca izolovana iz cveta *Chrysanthemum cinerariifolijum*. Njegovom primenom dolazi do promene napona natrijumovih kanala nervnih vlakana. Deluje kontaktno, ima „knockdown“ efekat i brzo dovodi do uginuća insekta.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Štetna vrsta	Količina primene	Vreme primene
Paradajz (u zaštićenom)	Leptiraste vaši (<i>Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci</i>)	0,3-1,08 l/ha	tretiranje tokom vegetacije, a nakon pojave prvih insekata (faze 21-87 BBCH skale)
	Moljac paradajza (<i>Tuta absoluta</i>)		
Plavi patlidžan (u zaštićenom)	Krompirova zlatica (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0,3-0,9 l/ha	tretiranje tokom vegetacije, a nakon pojave prvih insekata (faze 21-87 BBCH skale)
	Leptiraste vaši (<i>Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci</i>)		
	Tripsi		
Ukrasno bilje	Duvanov trips (<i>Thrips tabaci</i>)	0,3-0,6 l/ha	tretiranje nakon pojave prvih insekata
	Biljne vaši (<i>Aphis spp.</i>)		
	Leptiraste vaši (<i>Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci</i>)		

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima proveriti njihovu kompatibilnost.

NAPOMENA: Tretirati u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevним časovima. Voditi računa da nadzemni delovi biljaka budu dobro prekriveni tečnošću. U toku jedne godine na istoj površini može se primeniti maksimalno dva puta u ukrasnom bilju, tri puta u zasadima paradajza i plavog patlidžana u zaštićenom prostoru.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Paradajz, plavi patlidžan	2

PAKOVANJE: 1 l