

Selektivni, kontaktni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu soje.

AKTIVNA SUPSTANCA: Flumioksazin (500 g/l preparata)

DELOVANJE: Flumioksazin je herbicid koji pripada grupi N-fenilftalimidi (E; HRAC). Deluje na biosintezu hlorofila. Inhibira aktivnost PPO enzima što za posledicu ima peroksidaciju lipidnih membrana, odnosno ireverzibilno narušavanje njihove strukture i funkcije. Usvajaju ga klijanci ili ponikle biljke listom. U biljci se veoma ograničeno kreće floemom, zbog brzog i izraženog desikacionog delovanja.

PRIMENA:

Gajena biljka	Količina primene	Vreme primene
Soja	0,12 l/ha	posle setve, a pre nicanja korova i useva

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi:

Štir obični	<i>Amaranthus retroflexus</i>
Pepeljuga obična	<i>Chenopodium album</i>
Pepeljuga srcolisna	<i>Chenopodium hybridum</i>
Tatula obična	<i>Datura stramonium</i>
Poljska gorušica	<i>Sinapis arvensis</i>
Pomoćnica obična	<i>Solanum nigrum</i>
Lubeničarka njivska	<i>Hibiscus trionum</i>
Sivi muhar	<i>Setaria glauca</i>
Vijušac njivski	<i>Bylderdikia convolvulus</i>
Sirak divlji iz semena	<i>Sorghum halepense</i>

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima proveriti njihovu kompatibilnost.

NAPOMENA: Kada se primeni prema preporuci proizvođača Preparat FACTOR nije fitotoksičan za soju. U uslovima vlažnog i hladnog vremena može doći do prolazne fitotoksičnosti na lakim zemljištima. Flumioksazin je relativno nestabilan, sa niskim potencijalom spiranja u podzemne vode. U toku jedne godine na istoj površini može se primeniti maksimalno jednom.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Soja	obezbeđen vremenom primene

PAKOVANJE: 1 l