

Selektivni, h se isrtbeimcidič znai h suerzbiicjaidn, j ne ajemdennojgeno dziaš nsujizhb uij saknojl
nu eupsoelvjuo pkruivkruerdunzaim, s poojev, r ššeinčearmnae repe i suncokreta

AKTIVNA SUPSTANCA: Triklpir (triklopir butoksietil estar) (480 g/l preparata)

DELOVANJE: Galop® je preparat čija aktivna supstanca pripada grupi sintetskih auksina. Reč je o preparatu koji se apsorbuje kroz koren i list i kreće se naviše i naniže u biljkama. Nakon primene dolazi do nakupljanja u meristemskim tkivima i tačkama porasta. Svoje delovanje pokazuje kao indolsirćetna kiselina, izazivajući karakteristične simptome (kovrdžanje lišća, hloroza i nekroza tačke porasta).

PRIMENA:

Gajena biljka	Količina primene	Vreme primene
Nepoljoprivredne površine	1 l/ha	početak vegetacije, kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta, a drvenasti u fazi razvoja novog lišća.

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi:

Pijavac	<i>Acer negundo</i>
Štir obični	<i>Amaranthus retroflexus</i>
Pelenasta ambrozija	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>
Bagrenac	<i>Amorpha fruticosa</i>
Pelen crni	<i>Artemisia vulgaris</i>
Palamida	<i>Cirsium arvense</i>
Pavit	<i>Clematis vitalba</i>
Poponac njivski	<i>Convolvulus arvensis</i>
Tatula obična	<i>Datura stramonium</i>
Hudoletnica kanadska	<i>Erigeron canadensis</i>
Renika obična	<i>Lepidium draba</i>
Bokvica velika	<i>Plantago major</i>
Dvornik ptičji	<i>Polygonum aviculare</i>
Dvornik obični	<i>Polygonum persicaria</i>
Petoprnsnica puzeća	<i>Potentilla reptans</i>
Divlja ruža	<i>Rosa canina</i>
Štavelj obični	<i>Rumex crispus</i>
Burjan	<i>Sambucus ebulus</i>
Sapunjača	<i>Saponaria officinalis</i>
Pucavac	<i>Silene vulgaris</i>
Paskvica	<i>Solanum dulcamara</i>
Kozja brada	<i>Tragopogon major</i>
Mala kopriva	<i>Urtica urens</i>
Boca obična	<i>Xanthium strumarium</i>

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima proveriti njihovu kompatibilnost.

NAPOMENA: Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva. Dozvoljena je samo primena sa ukupnom količinom u toku godine od najviše 480 g a.s./ha. Na tretiranim površinama sadnja se može obaviti 6 meseci nakon primene sredstva. Ne sme se primenjivati na vrlo slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa) i na kraškim i erozivnim poljima, kao i na lakim i peskovitim zemljištima zbog mogućeg dospevanja u podzemne vode. Na tretiranim površinama, najmanje 63 dana posle primene ne puštati na ispašu životinje koje daju mleko, a 28 dana ostale domaće životinje.

PAKOVANJE: 1 l

