

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu

**AKTIVNA SUPSTANCA:** Flutriafol (250 g/l preparata)

**DELOVANJE:** Flutriafol je sistemski fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem iz grupe triazola, čiji mehanizam delovanja sprečava sintezu ergostrola gljive. Pruža najduži period rezidualne zaštite u svojoj klasi uz visoku mobilnost kroz ksilem unutar biljke. Nakon aplikacije brzo prodire kroz voštani sloj biljnog tkiva i akropetalno se širi unutar biljke sprečavajući nastanak oboljenja. Primenjuje se preventivno i u ranim postinfekcionim tretmanima ili nakon klijanja gljive na biljnoj površini kada zaustavlja infekciju. Preporučuje se preventivna aplikacija ili na samom početku infektivnog procesa.

### SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Patogen	Količina primene	Vreme primene
Šećerna repa	siva pegavost lista ( <i>Cercospora beticola</i> )	0,25 l/ha	u toku intenzivnog porasta biljaka, po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja
Pšenica	pepelnica ( <i>Blumeria graminis</i> )	0,5 l/ha	u toku faze klasanja i početka cvetanja (faze 30-61 BBCH skale), a na početku širenja oboljenja na gorenje lišće, posebno na list zastavičar i klas
	stabljkina crna rđa ( <i>Puccinia graminis</i> )		u toku faze vlatanja, klasanja i cvetanja (faze 30-69 BBCH skale)
	lisna mrka rđa ( <i>Puccinia recondita</i> )		
	prugasta žuta rđa ( <i>Puccinia hordei</i> )		po pojavi prvih simptoma
Jabuka	čadava pegavost lista i krastavost plodova ( <i>Venturia inaequalis</i> )	0,15-0,2 l/ha	preventivno po precvetavanju (faze 69/71 BBCH skale) ili posle listanja (faze 17/19 BBCH skale)
	pepelnica ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )		
Vinova loza	pepelnica ( <i>Uncinula necator</i> )	0,15-0,2 l/ha	preventivno pre ostvarivanja uslova za zarazu

# Imperium<sup>®</sup>

koncentrovana suspenzija

® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

**MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:** Pre mešanja sa drugim preparatima, posebno različitih formulacija proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

**NAPOMENA:** U toku jedne godine na istoj površini može se primeniti maksimalno 2 puta.

**KRAJNI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):**

Gajena biljka	Dani
Jabuka i vinova loza	28
Šećerna repa i pšenica	35

**PAKOVANJE:** 300 ml, 1 l

