

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovaca bolesti u zasadima jabuke i vinove loze.

AKTIVNA SUPSTANCA: Fluopiram (500 g/l preparata)

DELOVANJE: Fluopiram je jedinjenje koje pripada grupi piridinil – etil benzamida (SDHI, grupa 7; FRAC). Deluje kao inhibitor sukcinat dehidrogenaze, inhibira klijanje spora, izduživanje kličine cevi i porast micelije kod gljiva. Deluje protektivno i kurativno. Nakon primene se usvaja i translocira u biljkama, ispoljava i translaminarnu aktivnost, a može i da se kreće ksilemom.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Patogen	Koncentracija primene	Vreme primene
Jabuka	pepelnica (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0,03-0,04%	od početka bubrenja cvetnih pupoljaka do početka zrenja plodova (faze 51-81 BBCH skale)
	čađava pegavosti lista i krastavost plodova (<i>Venturia inaequalis</i>)	0,04-0,05%	
Vinova loza	pepelnica (<i>Erysiphe necator</i>)	0,03-0,05%	od fenofaze razvijenih 5 listova do momenta zrenja plodova (faze 15-87 BBCH skale)

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima proveriti njihovu kompatibilnost.

NAPOMENA: U toku jedne godine na istoj površini može se primeniti maksimalno dva puta.

KRAJNI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Jabuka	28
Vinske sorte grožđa	21
Stone sorte grožđa	3

PAKOVANJE: 1 l