



# Kozak<sup>®</sup>

koncetrat za emulziju

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

**Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu**

**AKTIVNA SUPSTANCA:** Lambda - cihalotrin (50 g/l preparata)

**DELOVANJE:** Lambda - cihalotrin je kontakti i digestivni insekticid iz grupe piretroida. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu.

### SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Štetna vrsta	Količina/ koncentracija primene	Vreme primene
Kupus	sovice (Noctuidae – <i>Mamestra</i> spp.)	0,2 l/ha	u vreme pojave larvi četvrtog stupnja
Šećerna repa	sovice (Noctuidae – <i>Mamestra</i> spp.)	0,2 l/ha	u vreme pojave larvi četvrtog stupnja
Malina	cvetojed ( <i>Anthonomus rubi</i> )	0,02- 0,03%	u vreme pojave imaga
Jagoda, kupina, borovnica			
Tikva, bundeva, tikvica, dinja, lubenica	biljne vaši (Aphididae)	0,25 l/ha	na početku formiranja prvih kolonija
Boranjija, pasulj, bob, sočivo, grašak, stočni grašak		0,15 l/ha	
Salata, spanać, blitva, zelje, rukola, radič, endivija i ma- tovilac	biljne vaši (Aphididae)	0,15 l/ha	na početku formiranja prvih kolonija
	lisne sovice ( <i>Mamestra</i> spp., <i>Mamestra brassicae</i> )	0,15-0,2 l/ha	pri pojavi larvi četvrtog stupnja
Kelj, karfiol, kelera- ba, brokoli, prokelj, rotkva, rotkvica i slačica	lisne sovice ( <i>Mamestra</i> spp., <i>Mamestra brassicae</i> )	0,15-0,2 l/ha	pri pojavi larvi četvrtog stupnja
Leska	biljne vaši (Aphididae)	0,2 l/ha	na početku formiranja prvih kolonija
	lešnikov surlaš ( <i>Balaninus nucum</i> )		tretiranjem u vreme pojave imaga, a pre polaganja jaja na mlade i zelene plodove lešnika
Jabuka	jabukin smotavac ( <i>Cydia pomonella</i> )	0,01-0,02%	na početku piljenja prvih gusenica (I, II ili po potrebi III generacije) ili 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama
Dunja			



# Kozak<sup>®</sup>

koncetrat za emulziju

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

**MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:** Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja. Ne sme se mešati sa **Bordovskom čorbom** i preparatima alkalne reakcije.

**NAPOMENA:** U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta, dok u zasadima jabuke, leske i dunje maksimalno jednom.

#### KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Tikva, bundeva, tikvica, dinja, lubenica	3
Salata, spanać, blitva, zelje, rukola, radič, endivija, matovilac, kelj, karfiol, keleraba, brokoli, prokelj, rotkva, rotkvica, slačica i leska	7
Jabuka, dunja, kupus, šećerna repa, boranija, pasulj, bob, sočivo, grašak, stočni grašak	14
Malina, jagoda, kupina, borovnica	28

**PAKOVANJE:** 50 ml, 300 ml, 1 l, 5 l

