METOD® 480 SC

koncentrovana suspenzija

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu

AKTIVNA SUPSTANCA: Kaptan (480 g/l preparata)

DELOVANJE: Kaptan je fungicid širokog spektar delovanja i koristi se za suzbijanje prouzrokovača gljivičnih bolesti na mnogim gajenim kulturama. Ova visoko reaktivna aktivna supstanca stupa u procese sa slobodnim amino i hidroksil grupama enzima gljiva što za posledicu ima inhibiciju disanja i drugih metaboličkih procesa. Ovim procesom se sprečava klijanje spora i disanje. Svoje delovanje ispoljava na više mesta u ćeliji gljive i one ne mogu da razviju rezistentnost na ovaj preparat.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Patogen	Količina primene	Vreme primene
Jabuka i kruška	čađava pegavost lista i krastavost plodova *(Venturia inaequalis, V. pyrina)*	2-3 l/ha	preventivno, pre ostvarivanja uslova za zaražavanje
Koštičavo voće (breskva, kajsija, višnja, trešnja, šljiva)	šupljikavost lista *(Stigmina carpophila)*	2-3 l/ha	početkom listanja, kada se očekuje veći infekcioni potencijal patogena i povoljni uslovi za širenje ili po pojavi prvih simptoma kada je manji infekcioni potencijal i manje povoljni uslovi za širenje oboljenja
Šljiva	plamenjača *(Polystigma rubrum)*	2-3 l/ha	
Vinova loza	plamenjača *(Plasmopara viticola)*	2-3 l/ha	po pojavi prvih pega primarnih zaraza, a pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje
Jagoda	siva trulež *(Botrytis cinerea)* siva pegavost lista *(Mycosphaerella fragarie)*	2-3 l/ha	preventivno početkom cvetanja do punog cvetanja (faze 55-65 BBCH skale) preventivno tokom vegetacije, pre sticanja uslova za zaražavanje
Malina, kupina	kestenjasta pegavost izdanaka *(Xenodydimella applanata)*	2-3 l/ha	Od početka intenzivnog porasta izbojaka do 7 dana pred berbu, i nakon završene berbe

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i sumporno-krečnom čorbom, EC i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije, sa sumporom u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova kod nekih sorti jabuke (Vinesep) i kruške (Starking, Sejman, Boskovas).

METOD® 480 SC

koncentrovana suspenzija

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

PRIMENA I NAPOMENE: U suzbijanju prouzrokovača bolesti u voćarskim zasadima izuzetan je partner za sve sistemične fungicide **(Pehar, Neon, Sekvenca, Akord)** radi proširenja delovanja na sve stadijume gljive i antirezistentnu strategiju.
Savremena tečna formulacija obezbeđuje bolju disperziju u rastvoru za tretiranje i pokrovnost preparata na tretiranoj površini, što je veoma značajno za kontaktne fungicide.
Može ispoljiti blagu fitotoksičnost („kaptanove pege“) kod nekih sorti jabuke ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova (period oko mesec dana), a naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora. Ne sme se primenjivati u zasadu jabuke sorte Crveni delišes i kruške Anžuj, zbog ispoljavanja fitotoksičnosti. Pripremljena suspenzija mora se utrošiti u roku od dva sata. U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je 2 - 3 puta za jagodu, tri puta za malinu i kupinu, a 4 puta za ostale namene.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka	**Dani**
Malina, kupina	7
jabučasto i koštičavo voće, jagoda	21
Vinova loza	35

PAKOVANJE: 300 ml, 1 l, 5 l