

# OCTANUS®

vododisperzibilne granule

\* Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

**Selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolistnih korova u usevu ozime pšenice**

**AKTIVNA SUPSTANCA:** Tribenuron-metil (600 g/kg preparata) + florasulam (200 g/kg preparata)

**DELOVANJE:** Tribenuron - metil je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolistne korove. Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna supstanca prouzrokuje inhibiciju aminokiselina valin i izoleucin, a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka. Florasulam je aktivna supstanca koja takođe deluje kao ALS inhibitor. Pripada grupi triazolopirimidina. Takođe, inhibira meristemsko tkivo i na taj način sprečava rast korova što dovodi do njihovog suzbijanja.

**PRIMENA:**

Gajena biljka	Količina primene	Vreme primene
Ozima pšenica	25 g/ha	kada su korovi u fazi 2-4 lista, a pšenica u fazi od drugog lista do pojave lista zastavičara (faze 12-39 BBCH skale)

**SPEKTAR DELOVANJA:**

**Vrste korova koje dobro suzbija**

**Jednogodišnji širokolistni korovi**

Kukolj	<i>Agrostemma githago</i>
Tarčužak obični	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Kopriva mrtva	<i>Lamium amplexicaule</i>
Mišjakinja obična	<i>Stellaria media</i>

**Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija**

**Jednogodišnji širokolistni korovi**

Broćika divlja	<i>Galium aparine</i>
Ljubičica poljska	<i>Viola arvensis</i>

**Višegodišnji širokolistni korovi**

Palamida njivska	<i>Cirsium arvense</i>
Poponac obični	<i>Convolvulus arvensis</i>

# OCTANUS®

vododisperzibilne granule

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

**MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:** Pre mešanja sa drugim preparatima proveriti njihovu kompatibilnost.

**NAPOMENE:** Ne sme se primenjivati u kraškim poljima i na kosim i erozivnim površinama. Ukoliko dođe do preoravanja parcele ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama, 30 dana nakon primene preparata, mogu se ponovo sejati samo jara strna žita. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

**KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):**

Gajena biljka	Dani
Ozima pšenica	obezbeđen vremenom primene

**PAKOVANJE:** 25g, 100g, 250g

