



Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolistnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici

AKTIVNA MATERIJA: Bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata)

DELOVANJE: Ostap sadrži dve aktivne materije sa različitim načinima delovanja. Kontaktno delovanje bentazona kao inhibitora fotosinteze prouzrokuje spaljivanje lišća, dok se dikamba translocira do meristemskog tkiva i izaziva zaustavljanje rasta biljke. Različitim mehanizmima aktivnih materija, koje se međusobno dopunjaju, postiže se brzo delovanje i visoka efikasnost u suzbijanju širokolistnih korova.

PRIMENA:

| Gajena biljka | Količina primene | Vreme primene |
|---------------------------------|------------------|---|
| Kukuruz (merkantilni i silažni) | 2 l/ha | tretirati usev kada ima razvijena 3 - 4 lista, a kada su korovi u fazi 2 - 4 lista |
| Pšenica (ozima i jara) | 1 l/ha | tretirati usev u fazi od 3 lista pa do kraja bokorenja, a kada su korovi u fazi 2-4 lista |

SPEKTAR DELOVANJA:

Primenjen u količini od **1 l/ha** OSTAP suzbija sledeće širokolistne korove:

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Ambrozija pelenasta | <i>Ambrosia artemisifolia</i> |
| Loboda obična | <i>Atriplex patula</i> |
| Vijušac njivski | <i>Bilderdykia convolvulus</i> |
| Pepeljuge | <i>Chenopodium spp.</i> |
| Žavornjak obični | <i>Consolida regalis</i> |
| Dimnjača obična | <i>Fumaria officinalis</i> |
| Mrtva kopriva crvena | <i>Lamium purpureum</i> |
| Dvornik ptičiji | <i>Polygonum aviculare</i> |
| Dvornik veliki | <i>Polygonum lapathifolium</i> |
| Gorušica poljska | <i>Sinapis arvensis</i> |
| Čistac jednogodišnji | <i>Stachys annua</i> |
| Mišjakinja obična | <i>Stellaria media</i> |
| Boca obična | <i>Xanthium strumarium</i> |

Primenjen u količini od **2 l/ha** OSTAP suzbija sledeće širokolistne korove:

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Štir obični | <i>Amaranthus retroflexus</i> |
| Tatula obična | <i>Datura stramonium</i> |
| Lubenčarka njivska | <i>Hibiscus trionum</i> |
| Dvornik obični | <i>Polygonum persicaria</i> |
| Pomoćnica obična | <i>Solanum nigrum</i> |
| Poponac obični | <i>Convolvulus arvensis</i> |



Ostap®

© Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

koncentrovani rastvor

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zbog proširenja delovanja u kukuruzu na uskolisne korove, može se mešati sa preparatom **Talisman**. Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.

PRIMENA I NAPOMENE: Ostap je pokazao visoku efikasnost u suzbijanju čak i najotpornijih krovskih vrsta, kao što su: tatula, vijušac njivski, ambrozija, pepeljuge i palamida.

Ne preporučuje se primena u semenskom kukuruzu sa podusevom i na slabo humusnim zemljjištima. U slučaju preoravanja, ili prevremenog skidanja useva mogu se sejati strna žita, soja i lucerka.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

| Gajena biljka | Dani |
|-------------------------------|----------------------------|
| Silažni i merkantilni kukuruz | obezbeđen vremenom primene |
| Pšenica (ozima i jara) | obezbeđen vremenom primene |

PAKOVANJE: 1 l, 10 l