

# PAMPAS®

koncentrovana emulzija

NOVO

\* Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

**Selektivni, translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje uskolisnih korova u usevu pšenice.**

**AKTIVNA SUPSTANCA:** Pinoksaden (50 g/l preparata)+ protektant klokvintocet-meksil (12,5 g/l preparata)

**DELOVANJE:** Pinoksaden je sintetičko jedinjenje koje pripada grupi fenilpirazolina (Grupa 1(A); HRAC). Efikasno suzbija uskolisne korove u usevu pšenice. Deluje tako što inhibira acetil koenzim A karboksilazu što je prvi korak u biosintezi masnih kiselina. Aktivna supstanca ima sistemično delovanje. Nakon usvajanja, brzo se translocira u nadzemni deo i koren korovskih biljaka.

#### PRIMENA:

Gajena biljka	Količina primene	Vreme primene
Pšenica	0,6-1,2 l/ha	kada je usev u fazi od 2 lista do pojave zastavičara (BBCH 12-39), a korovi u fazi od trećeg lista do prvog kolanca

#### SPEKTAR DELOVANJA:

##### Jednogodišnji uskolisni korovi:

Stršeća rosulja	<i>Apera spica-venti</i>
Obična svračica	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Italijanski ljujlj	<i>Lolium multiflorum</i>
Engleski ljujlj	<i>Lolium perenne</i>
Mačiji repak	<i>Alopecurus myosuroides</i>
Divlji ovas	<i>Avena fatua</i>

**MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:** Pre mešanja sa drugim preparatima proveriti njihovu kompatibilnost. Ne sme se mešati sa sredstvima za ishranu bilja i alkalnim sredstvima za zaštitu bilja. Ne preporučuje se primena sa hormonskim herbicidima ili primena ovih herbicida najmanje 7 dana nakon primene herbicida na bazi pinoksadena.

**NAPOMENA:** Nema opasnosti od pojave fitotoksičnih efekata ukoliko se primeni prema uputstvu za upotrebu. U toku jedne godine na istoj površini može se primeniti maksimalno jednom.

#### KRAJNJI ROK PRIMENE PRE ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Pšenica	OVP

**PAKOVANJE:** 1 l