



Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolistnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici

AKTIVNA SUPSTANCA: Klopipralid (300 g/l preparata)

DELOVANJE: Klopipralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. Izaziva reakcije tipa auksina. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.

PRIMENA:

Gajena biljka	Količina primene	Vreme primene
Šećerna repa	0,2-0,4 l/ha	kada je šećerna repa u fazi 2-4 lista (faze 12-14 BBCH skale), kada je palamida od faze rozete pa do visine 10-15 cm; kamilica u fazi 4-6 lisova; ostali korovi u fazi 2-6 listova
Uljana repica	0,2-0,3 l/ha	kada je usev od faze 2 lista, pa do visine 10-15 cm, kada je palamida od faze rozete pa do visine 10-15 cm; kamilica u fazi 4-6 lisova; ostali korovi u fazi 2-6 listova
Crni luk (osim mladog luka)	0,4-0,5 l/ha	nakon nicanja, kada je usev u fazi 2-4 lista; korovi u fazi 2-6 listova
Beli luk, praziluk, vlašac (osim mladog vlašca)	0,4-0,5 l/ha	nakon nicanja, kada je usev u fazi 2-4 lista, a za praziluk 10 dana nakon presađivanja; korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova (2-6 listova)
Cvekla (osim "baby leaf" programa)	0,2-0,4 l/ha	kada je usev u fazi 2-4 lista (faze 12-14 BBCH skale); korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova (2-6 listova)

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji širokolistni korovi:

Ambrozija pelenasta	<i>Ambrosia artemisifolia</i>
Prstenak poljski	<i>Anthemis arvensis</i>
Prstenak titričasti	<i>Anthemis cotula</i>
Smrduša obična	<i>Bifora radians</i>
Vijušac njivski	<i>Bilderdykia convolvulus</i>
Tarčužak obični	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Različak njivski	<i>Centaurea cyanus</i>
Pepeljuga sročislina	<i>Chenopodium hybridum</i>
Tatula obična	<i>Datura stramonium</i>
Mrkva obična	<i>Daucus carota</i>
Hudoletnica kanadska	<i>Erigeron canadensis</i>
Suncokret divlji	<i>Helianthus annuus</i>
Mrtva kopriva crvena	<i>Lamium purpureum</i>
Krstica obična	<i>Senecio vulgaris</i>
Pomoćnica obična	<i>Solanum nigrum</i>
Gorčika obična	<i>Sonchus oleraceus</i>
Boca obična	<i>Xanthium strumarium</i>



Pikogal® koncentrovani rastvor

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

Višegodišnji širokolisni korovi:

Palamida njivska
Gorčika rapava
Podbel obični
Grahorica ptičija

Cirsium arvense
Sonchus asper
Tusilago farfara
Vicia cracca

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U usevu šećerne repe može se mešati sa preparatom **Metak 700 SC.**

NAPOMENE: Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak, mrkva, peršun, paštrnak i detelina. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Šećerna repa, uljana repica, cvekla u vreme tehnološke zrelosti	obezbeđen vremenom primene
Crni luk, beli luk, praziluk, vlašac, mlada cvekla	42

PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l

