



PROMESA®

koncentrovana suspenzija

® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i ratarstvu

AKTIVNA SUPSTANCA: Azoksistrobin (250 g/l preparata)

DELOVANJE: Azoksistrobin je fungicid širokog spektra delovanja iz grupe strobilurina. Ima protektivno i kurativno delovanje, koje se ispoljava u sprečavanju klijanja spora, rastu micelije i sporulaciji, što se postiže inhibicijom transporta elektrona u respiratornom lancu. Nakon primene obezbeđuje kontaktno i sistemično delovanje transportovanjem sprovodnim sistemom ksilemom i dugotrajno delovanje na prouzrokovače bolesti.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Patogen	Količina/ koncentracija primene	Vreme primene
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>) peplnica (<i>Uromyces necator</i>)	0,075 %	po pojavi prvih pega primarnih zaraza pre ostvarene infekcije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma
Malina Kupina, borovnica, ribizla*	sušenje lastara (<i>Didymella applanata</i>)		preventivno, od faze prvih lastara visine oko 60 cm, kada se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja
Jagoda	siva pegavost lista (<i>Mycosphaerella fragariae</i>)	0,75 l/ha	od početka vegetacije, do početka zrenja i/ili posle berbe (faze 11/13-81 BBCH skale i/ili faza 91 BBCH skale) i to po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja
Krstavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		preventivno, od faze prava dva lista, u zavisnosti od vremenskih uslova i prisustva inokuluma u intervalima 8-10 dana
Tikva, tikvica, bundeve, dinja, lubenica*			preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje, a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma oboljenja
Krompir, paradajz			
Plavi patlidžan*			
Grašak, pasulj, boranija, bob, sočivo*	antraknoza (<i>Ascochyta pisi</i>)	1 l/ha	od faze kada su vidljivi prvi cvetni pupoljci do faze kada je 50 % mahuna dostiglo dužinu tipičnu za vrstu/sortu
Mrkva, peršun, celer, paštrnak*	pepelnica (<i>Erysiphe heraclei</i>) crna pegavost lista (<i>Alternaria dauci</i>)		od faze kada je razvijen prvi pravi list do završenog rasta-postignuta forma i veličina korena (faze 11-49 BBCH skale)



PROMESA®

koncentrovana suspenzija

* Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija

nastavak tabele sa prethodne strane

Gajena biljka	Patogen	Količina/ koncentracija primene	Vreme primene
Salata, spanać, zelje, blitva, rukola, radič, endivija, matovilac*	plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)	1 l/ha	od faze kada je razvijen 4. list pa do faze kada je biljka dostigla veličinu, formu i čvrstinu tipičnu za vrstu/sortu
Pšenica	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)		tokom vegetacije kada postoje uslovi za zaražavanje ili po pojavi prvih simptoma oboljenja (faze 25-61 BBCH skale)

* U toku je proces registracije

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i insekticida. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

PRIMENA I NAPOMENE: U zaštiti maline Promesa pored odličnog delovanja na "didimelu" ispoljava dobro sporedno delovanje na mnoge druge značajne bolesti ove kulture. Nalazi se na listama dozvoljenih aktivnih supstanci u svim evropskim zemaljama i predstavlja osnovu programa zaštite maline od prouzrokovaca bolesti.

U povrtarskoj praksi se često koristi preventivno tokom vegetacije, ali i kurativno ukoliko je došlo do ostvarene infekcije između berbi zbog kratke karence. Iako je kratka karencija jedna od važnih karakteristika, sa primenom u usevu lubenice treba početi 7-10 dana nakon rasanjanja jer Promesa pokazuje odlično delovanje protiv pojave bolesti gumozne plamenjače stabla.

U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je dva puta u zasadu jagode i usevu pšenice, a tri puta za ostale namene računajući i primenu drugih fungicida iz grupe strobilurina.

KRAJNI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Paradajz, plavi patlidžan	3
Krastavac, tikva, tikvica, bundeva, dinja, lubenica	4
Mrkva, peršun, celer, paštrnak, salata, spanać, zelje, blitva, rukola, radič, endivija, matovilac	7
Malina, jagoda, kupina, borovnica, ribizla	10
Krompir, grašak, pasulj, boranija, bob, sočivo	14
Vinova loza	21
Pšenica	35

PAKOVANJE: 50 ml, 200 ml, 1 l