



PROMESA®

koncentrovana suspenzija

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovaca bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i ratarstvu

AKTIVNA SUPSTANCA: Azoksistrobin (250 g/l preparata)

DELOVANJE: Azoksistrobin je fungicid širokog spektra delovanja iz grupe strobilurina. Ima protektivno i kurativno delovanje, koje se ispoljava u sprečavanju klijanja spora, rastu micelije i sporulaciji, što se postiže inhibicijom transporta elektrona u respiratornom lancu. Nakon primene obezbeđuje kontaktno i sistemično delovanje transportovanjem sprovodnim sistemom ksilemom i dugotrajno delovanje na prouzrokovache bolesti.

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka	Patogen	Količina/ koncentracija primene	Vreme primene	
Vinova loza	plamenjača (<i>Plasmopara viticola</i>) peplnica (<i>Unicnula necator</i>)	0,075 %	po pojavu prvih pega primarnih zaraza pre ostvarene infekcije, a najkasnije po pojavu prvih simptoma	
Malina	kestenjasta pegavost izdanaka (<i>Xenodydimella applanata</i>)		preventivno, od faze prvih lastara visine oko 60 cm, kada se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja	
Jagoda	siva pegavost lista (<i>Mycosphaerella fragariae</i>)	0,75 l/ha	od početka vegetacije, do početka zrenja i/ili posle berbe (faze 11/13-81 BBCH skale i/ili faza 91 BBCH skale) i to po pojavu prvih simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja	
Krastavac	plamenjača (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		preventivno, od faze prava dva lista, u zavisnosti od vremenskih uslova i prisustva inokulum u intervalima 8-10 dana	
Tikva, tikvica, bundeva, dinja, lubenica			preventivno, od fenofaze početka promene boje ploda, a najkasnije po pojavu prvih simptoma	
Paprika (na otvorenom)	antraknoza (<i>Colletotrichum spp.</i>)		preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje, a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma oboljenja	
Krompir, paradajz	plamenjača (<i>Phytophthora infestans</i>)			
Plavi patlidžan	crna pegavost (<i>Alternaria solani</i>)	1 l/ha	od faze kada su vidljivi prvi cvetni populci do faze kada je 50 % mahunu dostiglo dužinu tipičnu za vrstu/sortu	
Grašak	antraknoza (<i>Ascochyta pisii</i>)			



PROMESA®

koncentrovana suspenzija

® Zaštićena robna marka kompanije GALENIKA-FITOFARMACIJA

nastavak tabele sa prethodne strane

Gajena biljka	Patogen	Količina/ koncentracija primene	Vreme primene
Mrkva	pepelnica (<i>Erysiphe heraclei</i>) crna pegavost lista (<i>Alternaria dauci</i>)	1 l/ha	od faze kada je razvijen prvi pravi list do završenog rasta-postignuta forma i veličina korena (faze 11-49 BBCH skale)
Salata	plamenjača (<i>Bremia lactucae</i>)		od faze kada je razvijen 4. list pa do faze kada je biljka dostigla veličinu, formu i čvrstinu tipičnu za vrstu/sortu
Pšenica	pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)		tokom vegetacije kada postoje uslovi za zaražavanje ili po pojavi prvih simptoma oboljenja (faze 25-61 BBCH skale)

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom fungicida i insekticida. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

PRIMENA I NAPOMENE: U zaštiti maline Promesa pored odličnog delovanja na "didimelu" ispoljava dobro sporedno delovanje na mnoge druge značajne bolesti ove kulture. Nalazi se na listama dozvoljenih aktivnih supstanci u svim evropskim zemajama i predstavlja osnovu programa zaštite maline od prouzrokovaca bolesti.

U povrtarskoj praksi se često koristi preventivno tokom vegetacije, ali i kurativno ukoliko je došlo do ostvarene infekcije između berbi zbog kratke karence. Iako je kratka karenca jedna od važnih karakteristika, sa primenom u usevu lubenice treba početi 7-10 dana nakon rasadišvanja jer Promesa pokazuje odlično delovanje protiv pojave bolesti gumozne plamenjače stabla.

U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je dva puta u zasadu jagode i usevima pšenice i paprike, a tri puta za ostale namene računajući i primenu drugih fungicida iz grupe strobilurina.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):

Gajena biljka	Dani
Paradajz, plavi patlidžan, paprika (na otvorenom)	3
Krastavac, tikva, tikvica, bundeva, dinja, lubenica	4
Mrkva, salata	7
Malina, jagoda, kupina, borovnica, ribizla	10
Krompir, grašak	14
Vinova loza	21
Pšenica	35

PAKOVANJE: 50 ml, 200 ml, 1 l